

Sjeldne fugler i Buskerud 2020

Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

av Steinar Stueflotten

Året 2020 ble nok et bra år når det gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble registrert to nye arter: gråseiler og sitronerle. I tillegg kan funn av følgende sjeldne arter nevnes: ringgås ua. *bernicla*, tundrasædgås, amerikakrikkand, fjellmyrløper, rovtterne, gulnebbblom, enghauk, pirol, gulbrynsanger, trostesanger, rosenstær, sørlig gulerle, lappiplerke og dvergspurv. Rapporten omfatter 1263 funn av 129 arter, noe som er en fin økning fra året før. Ansvarsområdet til LRSK er endret i 2020 som følge av kommunereformen.

Saksbehandling

Denne rapporten er basert på 1263 registrerte funn av 129 arter, 4 underarter og 3 hybrider fra rapporteringsåret 2020. Dette er 19 % flere registreringer og 16 flere arter enn i 2019. Rapporten inneholder i tillegg 3 etterrapporteringer fra år før 2020: 1 fra hvert av årene 2017, 2018 og 2019. Denne rapporten refererer til fylkes- og kommuneinndelinger etter regions- og kommunereformen i 2020. Dette innebærer at sammenligner med data fra tidligere år i mange tilfeller ikke er relevant da definisjonen av regionen Buskerud nå er endret. De tidligere kommunene Røyken og Hurum er f.o.m. 2020 blitt en del av Asker kommune, mens tidligere Svelvik kommune i Vestfold nå er en del av Drammen kommune. LRSKs ansvarsområde på saksbehandlingsverktøyet Artsobservasjoner (AO) er dessverre ennå ikke blitt oppdatert i samsvar med den nye kommuneinndelingen. Dette har komplisert saksbehandlingen og utarbeidelsen av denne rapporten. LRSK Buskerud har fortsatt valideringsansvar for Røyken og Hurum, men ikke for Svelvik-delen av Drammen kommune.

I tillegg til endringene i LRSKs ansvarsområde som følge av kommunereformen, er det også gjennomført omfattende endringer i artsdefinisjoner og artssystematikk etter at NSKF la om norgeslisten iht. taksonomi og systematikk fra IOC World Bird List. Dette påvirker både antall arter og artsrekkefølgen som presenteres i denne årsrapporten.

LRSK har i forbindelse med denne rapporten ferdigbehandlet 127 godkjenningssaker av 36 arter/underarter/hybrider (flere av disse sakene gjelder de samme funnene). Dette er 19 flere saker enn i 2019 (+18 %). I tillegg har LRSK på vegne av LRSK Oslo og Akershus validert 11 saker fra Røyken og Hurum og fått hjelp fra LRSK Vestfold til validering av noen saker i tidligere Svelvik kommune. To saker (fjelljo og polarsisik) ble underkjent. I tillegg ble ett tidlig funn av nattergal underkjent, og 7 observasjoner av hhv. svartehavsmåke (1), båndkorsnebb (5) og polarsisik (1) ble ikke godkjent pga. ufullstendig rapportering. LRSK har i 2020 oversendt 4 saker til NSKF: ett funn av enghauk, to funn av trostesanger og ett funn av gråseiler. Disse funnene ble godkjent med unntak av ett av trostesanger-funnene.

LRSK har i 2020 bestått av: Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, Frode Nordang Bye og Anders Hals. Frode N. Bye valgte å fratre LRSK ved årsskiftet etter 15 års innsats for komiteen og er blitt erstattet av Jon Ludvig Hals. LRSKs oppgave er på vegne av Artsdatabanken å kvalitetssikre observasjoner av sjeldne og uvanlige fuglearter og -forekomster og publisere oversikter over alle godkjente funn i årlige rapporter. All saksbehandling i komiteen skjer fortløpende på Artsobservasjoner med supplerende diskusjoner via e-post om nødvendig. Derfor er det viktig at også alle observatører fortløpende rapporterer sine funn på AO og ikke venter for lenge med å sende inn sjeldenhetsrapporter til LRSK på arter som krever beskrivelse/dokumentasjon. Dette gjøres direkte i systemet fra valideringslista di som du finner ute til venstre på «Min startside». En oversikt over hvilke arter dette gjelder, finner du bakerst i denne rapporten. Du får også en direkte påminnelse om dette i form av en gul varseltrekant når du registrerer funn av arter som krever dokumentasjon med innsendelse av sjeldenhetsrapport til LRSK. Underkjente funn og funn av beskrivelsesarter med ufullstendig rapportering blir fjernet fra alle offisielle lister og allmenn visning på AO.

Det er godt å se at rapporteringen av både sjeldne og vanlige arter fortsatt holder seg høyt på AO. Totalt registrerte 539 personer 69.075 observasjoner av 235 fuglearter på Artsobservasjoner fra gamle Buskerud fylke i 2020. Dette er 58 flere personer (+12 %), ca. 10.100 flere observasjoner (+17 %), og 6 flere arter enn i 2019. I den nye Buskerud-regionen ble det til sammenligning registrert 66.077 observasjoner av 233 arter i 2020. LRSK takker alle rapportører som ved å registrere sine observasjoner på AO, har bidratt til å holde kunnskapen om sjeldne fuglers forekomst i Buskerud oppdatert. En ekstra takk til alle fotografene som har gitt sin tillatelse til å bruke bildene deres i denne rapporten.

Noen hovedtrekk fra fugleåret 2020

Fugleåret 2020 ble nok et bra år når det gjelder forekomst av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble observert to nye arter for regionen: **gråseiler** og **sitronerle**. Det foreligger riktignok et godkjent funn av sitronerle fra Svelvik i 2019 den gang Vestfold fylke. Stripegås har endret status fra E- til C-art og sædgås er splittet i to nye arter taigasædgås og tundrasædgås (tidligere underarter). Arten asiasvartstrupe er også splittet i to nye arter, russesvartstrupe og taigasvartstrupe som dessverre er vanskelige å skille fra hverandre. Dette innebærer at våre to funn av asiasvartstrupe i 2019 nå er registrert som ub. russe-/taigasvartstrupe. Antall godkjente arter i gamle Buskerud fylke har dermed økt

fra 309 til 313 arter per 2020. 11 av disse artene forsvinner imidlertid fra nye Buskerud som følge av at Røyken og Hurum nå er blitt en del av Asker kommune og dermed underlagt LRSK Oslo og Akershus sitt ansvarsområde. Tidligere Svelvik kommune bidrar ikke med nye arter til vårt ansvarsområde, men funnet av en sitronerle i 2019 blir ny art for Drammen kommune. Det betyr at vi i den nye Buskerud-regionen nå har 302 godkjente arter per 2020. I tillegg kommer 14 arter som ikke regnes som spontant forekommende som f.eks. snøgås, rapphøne og munkegribb. såkalte kategori D og E arter.

I tillegg til de to nye artene gråseiler og sitronerle bør følgende sjeldenheter fra 2020 nevnes spesielt: **ringgås ua. bernicla** (funn nr. 5), **tundrasædgås** (funn nr. 6-9), **stokkand x stjertand** (funn nr.2), **toppand x bergand** (funn nr. 3), **fjellmyrløper** (funn nr. 6), **rovterne** (funn nr. 7), **gulnebbblom** (funn nr. 6), **enghauk** (funn nr. 2), **trostesanger** (funn nr. 2), **rosenstær** (funn nr. 6-8), **sørlig gulerle** (funn nr. 7), **lappiplerke** (funn nr.10) og **dvergspurv** (funn nr. 4). For trostesanger var det nå gått 27 år siden førstefunnet i 1993 og for enghauk 7 år siden førstefunnet i mai 2013. Verdt å nevne er også nye funn (antall funn i 2020 i parentes) av: ringgås (2), stripegås (5), taigasædgås (1), tundragås (1), mandarinand (2), amerikakrikkand (1), rapphøne (1), gråstrupedykker (1), tundralo (1), lappspove (4), polarsnipe (4), tundrasnipe (1), sandløper (4), sotsnipe (2), dvergmåke (4), egretthegre (5), glente (2), hubro (1), lappugle (4), hærfulg (2), pirol (1), busksanger (3), svartrødstjert (2), svartstrupe (9), svartryggerle (2) og polarsisik (6). Det var store invasjon av både konglebit og båndkorsnebb høsten 2019 som strakte seg inn på nyåret i 2020, og høsten 2020 fikk vi en ny invasjon av haukugler. Verdt å nevne er også hekkefunn av hvitkinngås, gravand og hornugle, samt vinterfunn av hvitkinngås, stjertand, taffeland, bergand, vannrikse, toppdykker, vipe, rugde, kvartbekkasin, enkeltbekkasin, sildemåke, smålom, fjellvåk, musvåk, jordugle, tårnfalk, dvergfalk, vandrefalk, gransanger, munk, duetrost, vintererle, linerle, heipiplerke, bergirisk og sivspurv. De mange vinterfunnene skyldes trolig en svært mild vinter 2019/2020 og en ny mild desember i 2020.

Været 2020

Året 2020 var som helhet det varmeste som er målt med en årsmiddeltemperatur for Buskerud på hele 3,0 grader over normalen (1961-1990) som også er varmere enn det forrige rekordåret 2014. Årsnedbøren endte opp på 132 % av normalen som er det våteste året siden 2011. Året startet med en svært mild januar og februar med hele 7 grader over normalen og med litt under normal nedbør (90 %), noe som gjorde vinteren 2019/2020 til den varmeste som er målt både i Buskerud og Norge. Det var barmark mange steder i lavlandet til langt ut på nyåret, og Fiskumvannet frøs knapt til i løpet av denne vinteren, noe som er svært uvanlig. Også våren var mild med 2-3 grader over normalen i mars og april og med 25 % mindre nedbør enn normalt. Snøen var derfor stort sett borte medio mars. Den milde og fine starten på våren resulterte i tidlig ankomst av flere trekkfugler som grågås, krikkand, trane, skogdue, svartstrupe, duetrost, gransanger, tornirisk og snøspurv. Sommeren ble litt variabel. Juni var varm og våt med mange dager over 20 grader, og selv om det var litt kjølig i starten, endte måneden på 3 grader over normalen og med 150 % av normal nedbør. Juli ble våt og kjølig med 1,5 grader under normalen og med over 150 % av normal nedbør flere steder i Buskerud. August derimot ble varm og fin med nesten 2 grader over normalen og under 50 % av normal nedbør. Det fine augustværet fortsatte ut september, mens oktober ble heller våt med nesten dobbelt av normal nedbør. November derimot var stort sett mild og fin med 4 grader over normalen og mindre nedbør enn normalt i nedre deler av Buskerud. Desember ble også i 2020 svært mild med hele 5 grader over normalen og med 2-3 ganger så mye nedbør som normalt, hvorav mye kom som snø i jula. Vi hadde ingen kraftige høststormer eller ekstremvær i Buskerud dette året, følgelig ble det et dårlig år når det gjelder observasjoner av krykkjer, alkefugler og andre havfugler.




De første grågæssene ankom allerede medio februar. Her en på Steinberg, Drammen 05.03.20. Foto: Eli Bondlid

Funnstatistikk per kommune

Kommuneoversikten nedenfor viser antall funn av sjeldne arter registrert på Artsobservasjoner per kommune de tre siste årene. Som følge av kommunereformen inkluderer nye Drammen kommune i 2020 tidligere Nedre Eiker og Svelvik (Vestfold) kommuner, mens observasjoner i tidligere Røyken og Hurum kommuner ikke lenger teller med i denne rapporten da de nå er en del av nye Asker kommune. Tidligere Nes kommune har endret navn til Nesbyen kommune. Av Drammens 62 funn er 18 gjort i gamle Drammen kommune, 20 i Nedre Eiker kommune og 24 i Svelvik kommune. Tallene for 2018 og 2019 er oppdatert med noen mindre korrigeringer av funnmengden i noen kommuner disse årene. Tallene for 2019 er eksklusivt funn av munkegribben «Brinzola» som krysset Buskerud et par ganger.

Tabell 1: Funnstatistikk per kommune (antall godkjente funn av sjeldne arter på Artsobservasjoner).

Kommune	2018	2019	2020
Drammen*	12	13	62
Flesberg	5	2	10
Flå	11	6	12
Gol	32	19	30
Hemsedal	42	51	37
Hol	117	104	109
Hole	106	154	217
Hurum	131	125	-
Kongsberg	25	23	35
Krødsherad	5	4	8
Lier	96	107	93
Modum	25	28	61
Nedre Eiker	18	12	-
Nesbyen	13	19	25
Nore og Uvdal	22	23	32
Ringerike	99	137	236
Rollag	0	4	8
Røyken	25	36	-
Sigdal	8	5	16
Øvre Eiker	131	149	214
Ål	48	43	58
Sum Buskerud*	971	1064	1263



5x5 km ruter kodet etter antall sjeldne arter rapportert på Artsobservasjoner i 2020. Gule ruter 1-11 arter, de mørkeste røde rutene med > 45 arter.

De fleste kommunene viser en klar økning i antall funn i 2020. Bare Hemsedal og Lier har en liten nedgang. I 2020 er det Ringerike som topper lista med Hole og Øvre Eiker på de neste plassene. Mange aktive fuglekikkere i Tyrifjordsområdet har bidratt til dette gode resultatet. Kartet til høyre viser hvor i Buskerud det i 2020 er gjort sjeldne artsfunn. Som tidligere er det færrest funn i midtfylket, men også her har antall funn og antall ruter med sjeldne artsfunn økt i 2020. «Hot spots» finner vi som tidligere i områdene Nordre Tyrifjorden, Fiskumvannet og Linnestranda, men merk også gode ruter i Vikersund og på Grunnane ved Svelvik.

Endringer i rapporteringslista

De nye artene gråseiler og sitronerle er lagt til rapporteringslista. Båndkorsnebb er fra 1.7.2020 tatt ut av lista over arter med krav til beskrivelse. Krav til fotodokumentasjon for godkjenning av den vanligste gåsehybriden kanadagås x grågås fjernes fra 1.1.2021. For lappspurv, som var årets fugl i 2020, endres rapporteringskoden fra kun å omfatte vinterfunn til å gjelde alle funn av arten. Videre er vinterfunn av enkeltbekkasin lagt til listen, og definisjonen av vinterfunn for tidlig ankomne arter som gravand, tjeld, sanglerke og stær, er endret fra perioden desember-februar til perioden desember til 15. februar for å utelate funn av tidlig ankomne fugler på vårtrekket. Som følge av at NSKF har lagt om Norgeslisten iht. taksonomi og systematikk fra IOC World Bird List, er både artsdefinisjoner og artsrekkefølgen i denne årsrapporten lagt om. Dette kan nok virke litt uvant i starten, men vi håper det blir mer naturlig etter hvert.

Oppbygging av rapporten

Denne årsrapporten er bygd opp etter samme modell som tidligere. Opplysningene i artsomtalen er satt opp på følgende vis: (1) fuglens norske navn, (2) vitenskapelig navn, (3) * funnkategori som inngår i rapporten, f.eks. alle funn, hekkfunn eller vinterfunn, (4) antall registrerte funn i parentes med angivelse av antall akkumulerte funn/individer før rapportåret hvis kjent (vi har her beholdt akkumulerte tall for gamle Buskerud fylke), etterfulgt av antall funn/individer i rapportåret. For arter med over 100 funn før 2020, er antall akkumulerte funn nå utelatt. LRSK/NSKF til slutt betyr at arten er en beskrivelsesart godkjent av henholdsvis LRSK eller NSKF. (5) nyregistrerte etterrapporteringer fra tidligere år, (6) antall observerte individer i rapportåret med kjønn og alder hvis bestemt, (7)

Rapporterte og godkjente funn

ringgås (*Branta bernicla*):

* alle funn (31/5795 - 2/101) begge underarter.

ringgås, underart *bernicla* (*Branta bernicla bernicla*):

* alle underartsbestemte funn (4/8 - 1/1) LRSK

2020: 1 adult Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 23.5 *(F) (*Kendt Myrmo). 1 ind. Sandtangen, Onsaker, Hole 23.5 *(F) (Terje Pettersen, Kendt Myrmo).

Den mørkbukete, østlige underarten til ringgås (*bernicla*), sees bare fåtallig og sjeldent på vår- og høsttrekket i Buskerud. Samme individ som ble oppdaget av Kendt Myrmo på Karlsrudtangen tidlig om morgenen 23.5., ble sett på Sandtangen ved Onsaker noen timer seinere på dagen.

ringgås, underart *hrota* (*Branta bernicla hrota*):

* alle underartsbestemte funn (9/1526 - 1/100) LRSK

2020: Ca. 100 ind. ptN Nordfjorden utenfor Gomnes, Hole 27.5 *(F) (Kendt Myrmo).

De fleste observasjoner av trekkende ringgjess i Buskerud dreier seg om den lysbukete underarten *hrota* som hekker på Svalbard. Denne underarten kan av og til observeres i store flokker på flere hundre individer på vei inn Oslofjorden i månedsskiftet mai/juni. Noen av disse flokkene kan trekke videre over innlandet på vei nordover som flokken over Nordfjorden 27.5, men de fleste snur i Oslofjorden for å fortsette trekket videre nordover langs kysten. Akkumulert funnstatistikk inkluderer funn fra før 2020 i tidligere Røyken og Hurum kommuner.


hvitkinngås (*Branta leucopsis*):

* hekkefunn (2/4 par), vinterfunn (6 - 1)

Hekkefunn 2020: 1 par m/2 pulli Grunnane, Drammen 17.5 (Hans Petter Kristoffersen). 1 par m/1 pull Grunnane, Drammen 21.5 (Vidar Øverbye, Siw Hagstrøm). 1 par m/4 pulli Grunnane, Drammen 27.5 (Steinar Stueflotten). 3 adult + 2 unger utenfor reir, ikke utvokste Høyenhallstranda, Steinsfjorden, Hole 22.7 (Marius von Glahn).

Vinterfunn 2020: 1 ind. Midtre Sørums, Steinssletta, Hole 1.12 (Terje Pettersen). 1 ind. Steinsfjorden, Hole 8.-21.12 (*Terje Pettersen, Steinar Stueflotten, Richard Hals Gylseth, Ken Adelsten Jensen).

Flere par hekker på øyer og holmer i tidligere Røyken og Hurum kommuner, nå Asker kommune. Disse teller ikke lenger med i denne oversikten. Par med unger og mange adulte hvitkinngjess som observeres på Grunnane i tidligere Svelvik kommune, antas å komme fra Saltskjær på den andre siden av kommunegrensa i Asker (Hurum), men hekking på landsiden i/ved Grunnane kan ikke utelukkes. Hekkefunnet i Steinsfjorden er det første kjente hekkefunnet i Hole og i innlandet i Buskerud. Vinterfunnet på Midtre Sørums 1.12. antas å være samme individ som ble sett i Steinsfjorden noen dager seinere. Verdt å nevne er også 54 ind. som rastet i Vik, Steinsfjorden 29.8 (Terje Pettersen).



Første kjente innlands hekkefunn av hvitkinngås i Buskerud. Par med 2 pulli i Steinsfjorden, Hole 22.07.20.
Foto: Frode Munkhaugen

* alle funn (31/49 - 5/8)

2020: 2 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 14.5 (Bjørn Penk, Steinar Stueflotten, Jorunn Villand mfl.). 1 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 16.-29.5 (Lars Dolmen, Jon Ludvig Hals, Bjørn Penk, Jorunn Villand). 1 ind. Tjuvøya, Øvre Eiker 15.-16.8 (Geir Tøndel Fossum, Steinar Stueflotten). 2 ind. Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 26.8-10.9 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Steinar Stueflotten). 2 ind. Sandtangen, Onsaker, Hole 27.-28.8 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 2 ind. Drammenselva v/Krokstadelva, Drammen 16.9 (Rolf E. Andersen). 1 ind. Krokstadelva og Mjøndalen, Drammen 19.9-4.10 (Stein Edward James Grønning, Aleksander Solberg, Eli Bondlid, Melvin Åsum, Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 18.10 (Jorunn Villand, Lars Dolmen, Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 31.10 (Lars Dolmen).

* alle funn (12/24 - 1/1) LRSK

* vinterfunn (0), store antall ≥ 1000 ind.

* alle funn (5/7 - 4/4) LRSK

Den tidligere underarten til sædgås ua. *rossicus*, er nå splittet fra sædgås og opprettet som egen ny art tundrasædgås, mens funn av ubestemte sædgjess er erstattet av taksonet ubestemt taiga-/tundrasædgås. Den nye arten tundrasædgås observeres fåtallig og sporadisk i Buskerud i trekktidene vår (mars-april) og høst (oktober-november). Sjelden vintergjest. Alle observasjoner av 1 ind. i Nordfjorden, Ringerike 23-26.2 antas å dreie seg om samme individ selv om noen observasjoner er registrert som ub. taiga-/tundrasædgås. Dette er for øvrig det tidligste vårfunnet av denne arten som er registrert i Buskerud. Tundrasædgås ble tidligere ansett som sjelden i Norge, men ny kunnskap har vist at arten forekommer regulært på vårtrekket og som overvintrende langs kysten. En liten bestand av tundrasædgjess hekker også på Hardangervidda.

ub. taiga-/tundrasædgås (*Anser fabalis/serrirostris*):

* alle funn (55/238 - 1/4), inkluderer historiske funn av ubestemte sædgjess

2020: 4 ind. Øvre Svangtjørni, Dagali, Hol 19.5 (Gunnar Bjørn Gade, Per Furuseth).

Arten sædgås er nå splittet i to arter, de tidligere underartene taigasædgås og tundrasædgås. Artsnavnet sædgås brukes om tidligere ikke-underartsbestemte sædgjess. Nye slike ubestemte funn blir heretter registrert som ub. taiga-/tundrasædgås. Artsgruppen observeres fåtallig i trekketidene vår (mars-mai) og høst (september-november). Funnstatistikken for tidligere år er korrigert for kjente funn av de tidligere underartene taigasædgås og tundrasædgås og gjelder nå bare for ubestemte sædgjess.

tundragås (*Anser albifrons*):

* alle funn (40/58 - 1/3) inkl. underarter (LRSK)

2020: 3 ind. overflygende Tårnet, Fiskumvannet, Øvre Eiker 5.10 *(F) (Kjetil Flannum).

Arten observeres nesten årlig i lite antall i trekketidene vår (mars-mai) og høst (september-november), hyppigst i Nordre Tyrifjorden. De tre individene på Fiskumvannet tilhørte trolig ua. *albifrons*. Arten ble sist observert på Fiskumvannet 10.4.2016.

kanadagås x grågås (*Branta canadensis* x *Anser anser*):

* alle fotodokumenterte funn (26/30- 3/3) LRSK

2020: 1 ind. Averøya og Nordfjorden, Ringerike 2.-7.3 *(F) (*Marius von Glahn, Eli Bondlid, Aksel Olsson). 1 ind. Steinsvika og Maurøya, Steinsfjorden, Hole 12.-29.3 *(F) (Marius von Glahn, Terje Pettersen, Steinar Stueflotten). 1 ind. Åsatangen, Ringerike 8.6 *(F) (Aksel Olsson). 1 ind. Hovsfjorden, Hol 20.6-14.7 *(F) (Per Furuseth). 1 ind. Steinsvika, Hole 1.7 *(F) (Aksel Olsson). 1 ind. Sundvollstranda, Hole 18.7 *(F) (Aksel Olsson). 1 ind. Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 1.-4.8 *(F) (Marius von Glahn, Aksel Olsson). 1 ind. Vikersund, Modum 10.-13.9 *(F) (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen). 1 ind. Steinsfjorden, Hole 15.-21.12 *(F) (Steinar Stueflotten, Terje Pettersen, Ken Adelsten Jensen).

En hybrid kanadagås x grågås har hatt fast tilhold i Nordre Tyrifjorden de siste årene. Detaljer i hodetegningene på bildene av gåsa tyder på at det er den samme som ble observert i dette området også i 2020. Individene som ble observert i Hovsfjorden, Hol og Vikersund, Modum er andre individer. Hybriden som oppholdt seg i Hovsfjorden sammen med flere kanadagjess, er det første funnet av denne hybridene i nordre deler av Buskerud. Krav til fotodokumentasjon for godkjenning av denne relativt vanlige hybridene er fjernet f.o.m. 2021.

sangsvane (*Cygnus cygnus*):

* hekkefunn (8), sommerfunn (12)

Hekkefunn 2020: 1 par rugende Råen, Fiskumvannet, Øvre Eiker 5.4-17.5 (Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten mfl.), og 1 par m/8 unger utenfor reir, ikke utvokste Fiskumvannet, Øvre Eiker 2.-31.8 (Lars Dolmen, Melvin Åsum, Steinar Stueflotten, Jon Ludvig Hals mfl.). 1 par reirbygging Brennoddvikji, Tingvollfjorden, Ål 28.4 (Torgrim Breiehagen). 1 par rugende Ustedalsfjorden, Hol 4.5-7.6 (Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass, Trond Bølstad). 1 par rugende Synstevann, Buvatn, Nesbyen 7.-23.5 (Rolf E. Andersen). 1 par mislykket hekking Synstevann, Buvatn, Nesbyen 24.5 + 30.7 (Rolf E. Andersen). 1 par rugende Pålgardvatnet, Hol 29.-31.5 (Terje Hansen, Eirik Adolfsen). 1 hekking, 2 unger utenfor reir, ikke utvokste Flåmyri, Hemsedal 8.6 (Vegard Bang Fjeldheim). Mislykket hekking Fekjagranden, Ustedalsfjorden, Hol 24.6 (Trond Bølstad). 1 par m/5 unger utenfor reir, ikke utvokste Todalen, Nesbyen 24.6-12.7 (Per Furuseth, Einar Georg Mortensen). 1 par m/4 unger utenfor reir, ikke utvokste Puttetjønn, Rollag 10.8 (Finn Gregersen).

Sommerfunn 2020: 1 par i passende hekkebiotop Miletjern, Drammen 3.4-7.6 (Steinar Stueflotten, Melvin Åsum, Lennart Wam Hansson mfl.). 1 2K Attjerne, Hemsedal 3.6 (Vegard Bang Fjeldheim, Bent Fjeldheim). 1 2K Tangeviki, Strandafjorden, Ål 4.6 (Torgrim Breiehagen). 2 ind. Norefjorden, Nore og Uvdal 17.6 (Bjørn Lauritzen). 1 ind. Haglebu, Sigdal 20.6 (Michael Wam Hansson, Lennart Wam Hansson). 1 ind. observasjon i hekketid, passende biotop Herad, Gol 24.6 (Ken Adelsten Jensen). 1 par i passende hekkebiotop Bakkatjønnmyran, Austre Bakkatjønn, Nore og Uvdal 22.7 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning). 1 adult Mysutjern., Krødsherad 28.7 (Øystein Engen). 1 ind. Svarstadvika og Svendsrudvika, Hole 30.7-31.8 (Terje Pettersen, Marius von Glahn, Didrik Løstegård Kristensen). 1 2K+ rastende Ljøsuvatna, Flesberg 9.8 (Per Espen Fjeld). 2 ind. Lyseren NR, Gol 30.8 (Per Stensland). 2 ind. Reintjenn, Sigdal 30.8 (Svein Dale).

Arten hekker fast på noen få lokaliteter bl.a. i Hemsedal, Hol og Øvre Eiker. Ustedalsfjorden i Hol og Puttetjønn i Rollag er nye hekkelokaliteter. Bestanden er i økning i Buskerud. Paret som oppholdt seg i Miletjern, Drammen i to måneder, viste tydelig hekkeatferd selv om de ikke bygde reir og gikk til hekking. De hevdet territorium og hannen jagde jevnlig knoppsvanene som hekket i tjernet. Dette paret hekket i Miletjern året etter (2021).

gravand (*Tadorna tadorna*):

* hekkefunn (3 par), vinterfunn (0)

2020: 1-2 par med permanent revir Linnestranda, Lier 7.4-10.5 (Jens Erik Nygård, Rolf E. Andersen, Steinar Stueflotten mfl.). 1 par m/10-12 pulli Grunnane, Drammen 21-27.5 (Vidar Øverbye, Siw Hagstrøm, Steinar Stueflotten). 2 par m/9+10 pulli Grunnane, Drammen 4.6 (Steinar Stueflotten). 3 ad + 7 juv. Grunnane, Drammen 10.7 (Steinar Stueflotten).

Fåttallig og heller sjelden hekkefugl i kyststrøkene. Et territoriehevdende par oppholdt seg på Linnestranda fra ultimo mars til medio juni., to par samme sted det meste av april. Det ene paret gjorde trolig et mislykket hekkeforsøk. Gravender ble observert jevnlig på Grunnane fra mars til juli, derav minst 2 par med unger.

mandarinand (*Aix galericulata*):

* alle funn (31/32 - 2/2)

2020: 1 hann Linnestranda, Lier 21.-22.4 (*Ole Bjørn Braathen, Hans Petter Rømme, Steinar Stueflotten). 1 hann stasjonær Bacheparken, Landfalløya, Drammen 26.5-11.10 (Vidar Øverbye, Siw Hagstrøm, Bent Ellingsen, Steinar Stueflotten, Melvin Åsum, Jorunn Villand mfl.). 1 ind. Drammenselva v/Gulskogen, Gulskogen, Drammen 9.9 (Jostein Bærø Engdal). 1 ind. Drammenselva v/Gulskogen, Gulskogen, Drammen 19.9 (Bent Ellingsen).

Arten observeres normalt bare vår og høst i Buskerud og da nesten alltid som enslige hanner. Hannen som oppholdt seg i Bacheparken, Drammen i hele 4,5 måneder, er et særtilfelle så langt. Den var i tilnærmet praktdrakt da den ble oppdaget ultimo mai, men mytte etter hvert over i eklipsedrakt og tilbake til praktdrakt igjen medio september. Hannen ble ringmerket av Morten Lie 28.5. Den ble også sett ute i Drammenselva et par ganger i september, men ellers oppholdt den seg i Bacheparken sammen med stokkender. Denne hannen ble et populært fotoobjekt. Totalt ble den rapportert 49 ganger på AO i 2020. Det kan ikke utelukkes at det var den samme hannen som ble sett på Linnestranda i april.

knekkand (*Spatula querquedula*):

* alle funn (- 5/8)

2020: 1 hann Fiskumvannet, Øvre Eiker 1.-2.5 (Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten, Aleksander Solberg mfl.). 1 hunn Fiskumvannet, Øvre Eiker 3.-4.5 (Steinar Stueflotten, Erlend Landsverk, Jon Ludvig Hals mfl.). 1 par Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 8.5 (Agnar Målsnes, Gunn Mjelde). 1 par Fiskumvannet, Øvre Eiker 9.5 (Lars Dolmen, Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten). 1 adult hann Svarstadvika, Sælabonn, Hole 12.5 (Terje Pettersen). 1 par Svendsrudvika, Sælabonn, Hole 23.-24.5 (Terje Pettersen, Steinar Stueflotten). 1 adult hann Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 27.5 (Kendt Myrmo).

Arten observeres fåttallig, men regelmessig i sommerhalvåret, hyppigst om våren (april-mai). Gjennomsnittlig ankomstdato: 24.4. ± 12 dager (39 år). Flere av observasjonene antas å gjelde samme individer.

skjeand (*Spatula clypeata*):

* alle funn (- 10/31)

2020: 1 par Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 18.-26.4 (*Kendt Myrmo, Marius von Glahn, Eirik Kristoffersen). 5 ind. (4 hanner + 1 hunn) Fiskumvannet, Øvre Eiker 1.5 (Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten, Jorunn Villand, Lars Dolmen mfl.). 1 par Drivahølen, Hallingdalselva, Keivi, Hol 2.5 (Helen Jacobsen). 2 par Fiskumvannet, Øvre Eiker 3.5 (Andreas Hessvik-Trøite, Jorunn Villand, Steinar Stueflotten). 3 hanner Svarstadvika, Sælabonn, Hole 8.5 (Terje Pettersen). 1 hunnfarget Vassbonn, Bergsjø, Modum 10.-12.9 (*Steinar Stueflotten, Richard Hals Gylseth, Eirik Kristoffersen). 5 ind. (hunnfarget) Linnestranda, Lier 13.9 (Aleksander Solberg). 2 hunnfarget Vik, Steinsfjorden, Hole 24.-26.9 (Terje Pettersen). 1 hunn Vassbonn, Bergsjø, Modum 4.-8.10 (Eli Bondlid, Marius von Glahn). 5 hunnfarget Fiskumvannet, Øvre Eiker 5.10 (Jorunn Villand). 2 hunnfarget Juveren, Ringerike 9.-11.10 (Marius von Glahn). 3 hunnfarget Synneren, Ringerike 21.-25.10 (Terje Pettersen, Eli Bondlid).

Arten observeres fåttallig, men regelmessig, spesielt i trekketidene vår (medio april – mai) og høst (medio august – oktober). Gjennomsnittlig ankomstdato: 23.4. ± 10 dager (37 år). Observasjoner i nordfylket som det i Hallingdalselva ved Kleivi, Hol 2.5., er relativt sjeldne. Noen av observasjonene kan dreie seg om de samme individene.



Fem skjeender i flukt over Fiskumvannet, Øvre Eiker 01.05.20. Foto: Jon Ludvig Hals

snadderand (*Mareca strepera*):

* alle funn (86/151 - 6/20)

2020: 1 par Svarstadvika og Svendsrudvika, Hole 22.4-5.5 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Marius von Glahn mfl.). 2 par Svarstadvika, Sælabonn, Hole 1.5 (Kendt Myrmo). 1 hann Fiskumvannet, Øvre Eiker 4.5 (Jostein Myre). 1 hann Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 5.5 (Terje Pettersen). 1 hann Juveren, Ringerike 7.5 (Marius von Glahn). 1 par Juveren, Ringerike 9.5 (Terje Pettersen). 5 ind. (3 hann + 2 hunn) Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 10.5 (Terje Pettersen). 1 par Averøya Strandsone, Nordfjorden, Ringerike 11.5 (Marius von Glahn). 1 par Juveren, Ringerike 13.5 (Terje Pettersen). 6 adult Juveren, Ringerike 19.5 (Richard Hals Gylseth). 2 ind. Grunnane, Drammen 18.9 (Jostein Bærø Engdal). 1 par Synneren, Ringerike 3.10 (Håkan Billing, Ester Stern).

Arten er i seinere år observert årlig på vårtrekket (april-mai), gjennomsnittlig ankomstdato: 22.4. ± 12 dager (25 år), noe sjeldnere sommer og høst (sep.-okt.). Individene som ble observert på diverse lokaliteter i Ringerike i mai, antas å være blant de samme totalt 5-6 individene. Ingen observasjoner på Linnestranda i Lier, der den pleier å være tilnærmet årlig på vårtrekket.

brunnakke (*Mareca penelope*):

* hekkefunn (1)

2020: 1 adult hunn m/7 unger utenfor reir, ikke utvokste Solberg tjern, Tyristrand, Ringerike 9.7 (Marius von Glahn, Frode Munkhaugen).

Fåtallig og heller sjelden hekkefugl i Buskerud. Solberg tjern er en kjent hekkelokalitet fra tidligere år. Arten er observert i hekketiden i passende biotop på et par lokaliteter til, men uten at hekking ble sikkert påvist.

[stjertand] (*Anas acuta*):

* hekkefunn (0), vinterfunn (13/13 - 1/1)

2020: 1 ikke-spontan hann stasjonær Fjordparken og Bragernesløpet, Drammen By, Drammen 2.1-23.2 (Steinar Stueflotten, John Apeland, Eli Gates, Vidar Øverbye mfl.). 1 hann Fjordparken, Drammen By, Drammen 2.12 (Steinar Stueflotten).

Fåtallig hekkefugl i nordfylket, men ingen kjente hekkefunn i 2020. Den ikke-spontane hannen med lys blågrå plastring på venstre fot, overvintret i Fjordparken, Drammen for tredje vinteren på rad 2020/2021. Den ble sett på lokaliteten fram til 9.3.2020 og dukket opp igjen på samme sted primo november 2020.

stokkand x stjertand (*Anas platyrhynchos* x *A. acuta*):

* alle fotdokumenterte funn (1/1 - 1/1) LRSK

2020: 1 2K+ hann Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 29.3-6.4 *(F) (Marius von Glahn, Terje Pettersen, Kendt Myrmo). 1 hann Svarstadvika, Sælabonn, Hole 6.-11.5 *(F) (Terje Pettersen).

Meget sjelden hybrid som kun er observert en gang tidligere i Buskerud: 1 hann Steinsvika, Hole 13-28.4.1998. Begge observasjonen i 2020 antas å dreie seg om samme individ.

amerikakrikkand (*Anas carolinensis*):

* alle funn (11/11 - 1/1) LRSK

2020: 1 hann Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 19.4 *(F) (*Marius von Glahn, Didrik Løstegård Kristensen, Terje Pettersen). 1 hann Synneren, Ringerike 21.-25.4 *(F) (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Terje Moen, Eli Bondlid mfl.).

Sjelden art fra Nord-Amerika, sist observert på Fiskumvannet, Øvre Eiker 31.3.-3.4.2016. Siste observasjon i Nordre Tyrifjorden ble gjort i Juveren, Ringerike i april 2005. Hannen på Karlsrudtangen 19.4 og hannen i Synneren et par dager seinere antas å være samme individ.



Amerikakrikkand hann Synneren, Ringerike 21.04.20. Foto: Terje Pettersen

taffelend (*Aythya ferina*):

* alle funn (- 4/4)

2020: 1 adult hann Svarstadvika, Sælabonn, Hole 11.5 (Terje Pettersen). 1 adult hann Fiskumvannet, Øvre Eiker 14.-19.11 (Andreas Hessvik-Trøite, Melvin Åsum, Steinar Stueflotten mfl.). 1 adult hunn Synneren, Ringerike 22.12 (*Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 adult hann Solumstrand, Drammen 24.12 (Bjørn Einar Sakseid).

Arten observeres årlig i lite antall på vårtrekket (april – mai) og høsttrekket (september – medio november), hyppigst på Fiskumvannet og i Nordre Tyrifjorden, sjeldent ellers. Gjennomsnittlig ankomstdato: 17.4. ± 16 dager (35 år). Vinterfunn er relativt sjeldne.

bergand (*Aythya marila*):

* hekkefunn (1), vinterfunn (4/4)

2020: 1 hunnfarget Svendsrudvika, Sælabonn, Hole 9.1 (Terje Pettersen). 1 adult m/1 unge utenfor reir, ikke utvokst Fiskedammen, Gol 2.-7.8 (Jan Alsvik, Marit Karin Alsvik). 1 hunnfarget Vikersund bru, Vikersund, Modum 6.12 (Eirik Kristoffersen). 1 hunnfarget Nordfjorden, Ringerike 16.12 (Kendt Myrmo). 1 1K Vik, Steinsvika, Herøysundet og Bjørsrudvika, Steinsfjorden, Hole 18.-29.12 (Richard Hals Gylseth, Terje Pettersen, Kendt Myrmo mfl.).

Sparsom hekkefugl i øvre deler av fylket. Sees ellers årlig på vår- og høsttrekket. Vinterfunn er sjeldne.

toppand x bergand (*Aythya fuligula x A. marila*):

* alle funn (2/2 - 1/1) LRSK

2020: 1 hann Tangeviki, Strandafjorden, Ål 20.5 *(F) (Torggrim Breiehagen).

Sjelden andehybrid som ble observert på samme lokalitet 27.5-17.6.2015 og 16.5.2016. Det er rimelig å anta at det dreier seg om samme individ som har fulgt med toppender på vårtrekket alle år. Antall akkumulerte funn er derfor å forstå som sum av årsfunn.

ærfugl (*Somateria mollissima*):

* innlandsfunn (12 - 2/3)

2020: 1 par rastende Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 1.5 (Kendt Myrmo). 1 hann rastende Tangeviki, Strandafjorden, Ål 1.5 (Torggrim Breiehagen, Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass, Agnar Målsnes, Gunn Mjelde).

Vanlig og til dels tallrik hekkefugl i kystområdene, men sjelden gjest i innlandet om våren. Sist arten ble observert på en innlandslokalitet i Buskerud, var på Fiskumvannet våren 2017. Funnet i Strandafjorden er funn nr. 2 for Ål. Første funn ble gjort våren 1993.

sjøorre (*Melanitta fusca*):

* hekkefunn (0), funn ≥ 20 ind.

2020: 30 ind. rastende Tyrifjorden midtfjords, Hole 27.6 (Marius von Glahn). 20-180 ind. Grunnane, Drammen 7.5-20.9 (Steinar Stueflotten, Lennart Wam Hansson, Vidar Øverbye, Gustav Aagenes Ersdal mfl.), maks. 100-180 ind. i perioden 13.6-27.8.

Sjøorren hekker spredt i indre fjellstrøk, men ingen kjente hekkefunn i 2020. Arten sees sporadisk i lavlandet utenom hekketida og regelmessig langs kysten høst og vinter. Som tidligere år, rastet det et stort antall sjøorrer på Grunnane ved Svelvik og i Vollebukta ved Verket (Asker) gjennom våren og sommeren. Årsaken til de store antallene på > 100 ind. sommeren 2020 kan skyldes mye snø og sein vår i fjellet.

svartand (*Melanitta nigra*):

* hekkefunn (0), funn ≥ 20 ind.

2020: 134 ind. rastende Frognøya V, Tyrifjorden, Hole 28.4 (Terje Pettersen). 35 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 24.10 (Steinar Stueflotten). 40 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 11.11 (Steinar Stueflotten).

Fåtallig hekkefugl i fjellet i nordfylket, men ingen kjente hekkefunn i 2020. En kurtiserende hann og 3 hunner ble sett på et åpent vann i nærheten av mulig snødekt hekkeplass i Hol 17.6. (Hans Peter Melby). Større flokker på ≥ 20 ind. som de refererte, er heller sjeldne. Store flokker ble også observert i Oslofjorden i tidligere Hurum kommune både 7. juni og 1. november. Sein vår og mye snø i fjellet kan være en mulig årsak til slike samlinger på vårtrekket.

havelle (*Clangula hyemalis*):

* alle funn (- 13/21)

2020: 1 hunnfarget Råen, Krødsherad 18.4 (Marius von Glahn). 2 ind. Steinsfjorden nord, Ringerike 18.5 (Terje Pettersen). 4 ind. Ustedalsfjorden, Hol 24.5 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 hunnfarget Søndre Tyrifjorden NR, Modum 26.5 (Marius von Glahn). 1 par Ustedalsfjorden, Hol 27.5-3.6 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 par Vatsfjorden øvre, Ål 1.6 (Bård Kyrkjedelen). 1 hunn Strandafjorden midtre, Ål 8.6 (Hans Petter Kristoffersen). 1 hunnfarget Steinsfjorden nord, Åsa, Ringerike 9.10 (Marius von Glahn). 1 hann Høyenhallstranda, Steinsfjorden, Hole 14.-27.10 (Terje Pettersen, Steinar Stueflotten, Kendt Myrmo, Aksel Olsson). 1 1K Småøyene, Steinsfjorden, Hole 19.10 (Richard Hals Gylseth). 1 ind. Bergsjø, Modum 22.10 (Eli Bondlid). 1 1K Kroksund, Sundvollen, Hole 25.10-17.11 (Terje Pettersen, Rune Zakariassen, Marius von Glahn mfl.). 1 hunn Bjørsrudvika, Steinsfjorden, Hole 27.10 (Terje Pettersen). 1 ind. Sundøya, Hole 5.11 (Aksel Olsson). 3-4 ind.

Sjelden hekkefugl i indre fjellstrøk, men ingen kjente hekkefunn i 2020. Ellers fåtallig og sporadisk observert i lavlandet på vårtrekket (april-mai) og høsttrekket (oktober-november), mer sjeldent i lavlandet om sommeren. Gjennomsnittlig ankomstdato: 3.5. $\pm$ 12 dager (24 år). Seineste observasjon i gjennomsnitt: 15.11. $\pm$ 20dager (24 år), sjelden vintergjest.

* alle funn (- 4/5)

Arten opptrer årvisst i Buskerud i vinterhalvåret oktober – april. Hyppigst på vårtrekket ultimo mars - medio mai og på høsttrekktet i oktober-november. Antall funn kan variere mye fra år til år. Observasjonene i Synnøen og Juveren i mars-april dreier seg sannsynligvis om det samme paret.

* alle funn (10/15 - 1/1) LRSK

Funn av rapphøner i Buskerud dreier seg kun om rømte/utsatte fugler og er derfor plassert i kategori E. Arten ble sist observert ved Fiskumvannet i 2016.

* alle funn (- 23/26)

[illegible]

12

nattravn (*Caprimulgus europaeus*):

* alle funn (- 9/11)

2020: 1 ind. sang/spill Lauvbråten, Tørrbekk, Eikeren, Øvre Eiker 25.5-9.6 (Steinar Stueflotten, Bjørn Lauritzen). 1 ind. sang/spill Storekleiv, Eikeren, Øvre Eiker 25.5-27.6 (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen, Lars Petter Marthinsen, Morten Jagdum mfl.). 1 ind. sang/spill Glenåsen, Svelvik, Drammen (Frode Nordang Bye). 1+ ind. sang/spill Slettfjell, Øvre Eiker 10.-21.6 (Bjørn Lauritzen, Thomas Nielsen). 1 ind. sang/spill Gamlegrendåsen, Kongsberg 11.6 (Bjørn Lauritzen). 1-2 ind. sang/spill Tørrbekk, Eikeren, Øvre Eiker 13.6-1.7 (Jon Ludvig Hals, Lars Dolmen, Andreas Hessvik-Trøite, Bjørn Penk mfl.). 2 ind. Eventyrveien, Krokstadelva, Drammen 16.6 (Andreas Hessvik-Trøite). 1 ind. sang/spill Skapertjern, Lier 28.6 (Noah Penk). 1 ind. sang/spill Lauvbråten, Tørrbekk, Eikeren, Øvre Eiker 1.7 (Steinar Stueflotten).

De fleste funn er gjort på tidligere kjente lokaliteter, de fleste ved Eikeren. Gamlegrendåsen og Krokstadelva er nye lokaliteter. Gjennomsnittlig ankomstdato i Buskerud: 16.5. ± 11 dager (24 år). Noen av observasjonene langs Eikeren kan dreie seg om de samme individene. Mange gode nattravnlokaliteter på Hurumlandet, nå i Asker, er ikke lenger med i denne rapporten.

gråseiler (*Apus pallidus*):

* alle funn (0 - 1/1) NSKF

2020: 1 ind. næringssøkende Mosmoen, Hole 27.10 *(F) (Terje Pettersen).

Sjelden gjest fra Middelhavs-området med kun 17 godkjente funn i Norge per 2020. De fleste av disse observasjonene er gjort om høsten i oktober-november. I dette tilfellet fikk observatøren Terje Pettersen heldigvis tatt flere gode bilder av fuglen, slik at godkjenningen av funnet ble enkel for NSKF. Ny art for Buskerud!



Gråseiler Mosmoen, Hole 27.10.20. Ny art for Buskerud! Foto: Terje Pettersen

skogdue (*Columba oenas*):

* hekkefunn (1), vinterfunn (9/20 - 0); funn i øvre Buskerud (8/10 - 0) LRSK

2020: 2 ind. permanent revir Røsholmen, Averøya, Ringerike 11.6 (Marius von Glahn).


Skogdua hekker fåtallig i nedre deler av Buskerud. Arten er sjelden å se i øvre deler. Vinterfunn er sjeldne. Det er gjort flere observasjoner av par og syngende individer i hekketiden i passende hekkebiotop, men uten at hekking er sikkert påvist.

* alle funn ≥ 5 ind. (3), hekkefunn (0)

Fåttallig og spredt hekkefugl i Buskerud, men ingen kjente hekkefunn i 2020. Bare hekkefunn og funn av flokker på fem eller flere individer refereres i denne rapporten. Antatt samme fugler på samme lokaliteter teller som ett funn. Flokker på ≥ 5 ind. ble observert på 3 lokaliteter i 2020.

* alle funn (- 16/20)

2020: 1 ind. lokkelyd Svendsrudvika, Sælabonn, Hole 1.4 (Marius von Glahn). 1 ind. lokkelyd Fiskumvannet, Øvre Eiker 25.4 (Jon Ludvig Hals, Morten Jagdum). 1 ind. lokkelyd Svendsrudvika, Sælabonn, Hole 13.5 (Terje Pettersen). 1 hann sang/spill Møysund, Linnestranda, Lier 19.-20.5 (Hans Petter Rømme, Steinar Stueflotten). 1-3 ind. sang/spill Stein-Hungerholt-Hårum, Steinssletta, Hole 26.5-29.6 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Steinar Stueflotten mfl.). 1 ind. sang/spill Svarstadvika, Sælabonn, Hole 9.-10.6 (Terje Pettersen). 1 ind. sang/spill Råen, Fiskumvannet, Øvre Eiker 13.6 (Lars Dolmen, Jon Ludvig Hals). 1 ind. sang/spill Onsakervika, Onsaker, Hole 25.6-3.7 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo). 1 ind. lokkelyd Synneren sør, Ringerike 25.-27.6 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen). 1 ind. Miletjern, Drammen 1.7 (Inger-Lill Portaasen). 1 ind. sang/spill Svendsrudvika, Sælabonn, Hole 3.-5.7 (Terje Pettersen). 1 ind. lokkelyd Fiskumvannet, Øvre Eiker 3.-5.7 (Steinar Stueflotten, Lars Dolmen mfl.). 1 ind. sang/spill Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 9.7 (Kendt Myrmo). 1 ind. lokkelyd Linnestranda, Lier 15.-22.7 (Melvin Åsum, Jorunn Villand). 1-3 ind. lokkelyd Linnestranda, Lier 10.8-4.10 (Jorunn Villand, Steinar Stueflotten, Hans Petter Rømme, Jens Erik Nygård mfl.). 1 ind. lokkelyd Hungerholt, Steinssletta, Hole 14.8 (Terje Pettersen). 1 ind. lokkelyd Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 2.9 (Terje Pettersen). 1 ind. Linnestranda, Lier 10.11 (Steinar Stueflotten). 1 ind. lokkelyd Linnestranda, Lier 24.12 (Steinar Stueflotten).



Arten observeres årlig i perioden april – november, hyppigst på Linnestranda og Fiskumvannet. 1.4. er tidligste registrerte ankomstdato til nå, jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 4.5. $\pm$ 20 dager (23 år) og 23.4. siste 10 år. Arten hekket trolig på Linnestranda og Steinssletta i 2020. Vinterfunn som det på Linnestranda 24.12., er sjeldne.

* alle funn (- 2/2)

2020: 1 ind. sang/spill Vollgata-Tolpinrud på grensa Hole/Ringerike 11.6 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Marius von Glahn). 1 ind. sang/spill Kroksrud, Modum 23.6 (Gudmund Saastad, Steinar Stueflotten mfl.).

Arten observeres fåtallig og årlig i nedre deler av Buskerud, mer sjeldent i øvre deler. Få funn de tre siste årene. Arten ankommer normalt Buskerud i siste halvdel av mai, gjennomsnittlig ankomstdato: 27.5. ± 9 dager (24 år). Åkerriksa på Kroksrud gård ble hørt på lokaliteten av grunneier Gudmund Saastad fra medio juni til medio juli. Bonden valgte selv å utsette slåttene av grasenga rundt sangområdet til medio august. Med hjelp fra NOF avd. Buskerud ble det ordnet med økonomisk kompensasjon på 25.500 kr for dette tiltaket. Det ble publisert en artikkel om saken i Bygdeposten 09.09.20. Det var trolig et par på denne lokaliteten og mulig hekking.

* alle funn (63/73 - 8/8)

2020: 1 ind. sang/spill Vaker, Ringerike 15.-19.6 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen, John Stenersen). 1 ind. sang/spill Skollerudelva, Hallingby, Ringerike 20.-24.6 (Terje Pettersen, Jørn Lønner). 1 ind. sang/spill Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 20.-30.6 (Andreas Hessvik-Trøite, Morten Jagdum, Steinar Stueflotten, Melvin Åsum mfl.). 1 ind. lokkelyd Ullern og Svarstadvika, Sælabonn, Hole 21.-24.6 (Terje Pettersen). 1 ind. sang/spill Hungerholt, Steinssletta, Hole 24.-26.6 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo). 1 ind. sang/spill Onsakervika, Onsaker, Hole 24.-27.6 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo). 1 ind. sang/spill Solberggjern, Tyristrand, Ringerike 26.6 (Terje Spolén Nilsen, Marthe Seem). 1 ind. sang/spill Lamyra S, Lamoen, Hole 27.-29.6 (Jens Tøndel Fossum, Steinar Stueflotten).

Arten er blitt observert fåtallig (1-2 ind.) nesten årlig i perioden mai-juli i nedre deler av fylket, sjeldnere i perioden august-medio oktober. Mange funn i 2020, spesielt i Hole. Sein ankomst (15.6.), jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 23.5. $\pm$ 13 dager (23 år).

* hekkefunn (2), vinterfunn (0)

Hekking ble påvist på to av de kjente hekkeplassene i Buskerud: Miletjern (Drammen) og Huseby V (Lier). I tillegg ble arten observert på et par lokaliteter til i hekketiden i passende biotop, men uten at hekking ble påvist. Første observasjon våren 2020: 10.4., jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 16.4. $\pm$ 10 dager (37 år).

* hekkefunn (4), vinterfunn (0)

Fåttallig hekkefugl i Buskerud, bestanden er trolig økende. Observasjonene på Golsfjellet 31.5. og 2.7. antas å gjelde samme hekkefunn. Det er gjort flere observasjoner av traner på passende hekkebiotop i 2020, men bare observasjonene nevnt ovenfor med bekreftet hekking. Vinterfunn er lite sannsynlig i Buskerud.

* alle funn (- 15/24)

[illegible]

* alle funn (15/16 - 1/1) LRSK

* hekkefunn (10/19 kull), vinterfunn (6/41 + 8/44)

15

Steinsfjorden 30.7 (Marius von Glahn). LIER: 1 par rugende Ulvenvannet N 3.5 (Jens Erik Nygård). 1 par m/3 unger utenfor reir, ikke utvokste Damtjern 15.7-7.8 (Jorunn Villand, Moisés Peregrina). MODUM: 1 par reir-bygging Sponevika, Bergsjø 29.4 (Anne Sørensen) og 1 ind. rugende Bergsjø 28.5 (Eirik Kristoffersen). RINGERIKE: 2 kull med minst 2+2 unger utenfor reir, ikke utvokste Juveren 4.4-30.8 (Marius von Glahn, Steinar Stueflotten, Terje Pettersen mfl.). 1 par m/2 unger utenfor reir, ikke utvokste Åsatangen, Åsa 5.7 (Marius von Glahn). ØVRE EIKER: 5 par hekket i Fiskumvannet, første par i gang med reirbygging allerede 29.3., første kull sett 10.6., maks. 9 pulli 13.8. (Lars Dolmen, Melvin Åsum, Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten mfl.). Vinterfunn 2020: LIER: 1 ind. Linnesstranda 1.1 (Jens Erik Nygård, Hans Petter Rømme, Berit Roll Elgsaas). 1 1K Linnesstranda 24.12 (Jorunn Villand mfl.). MODUM: 2-4 ind. søndre Tyrifjorden (Vikersund-Nakkerud) januar-februar (Bjørn Harald Larsen, Marius von Glahn mfl.). Maks. 3-4 ind. Vikersund-Bergsjø desember (Eirik Kristoffersen, Håkon Brandt Fjeld). HOLE: 1-12 ind. Steinsfjorden desember, maks. 12 ind. Vik 8.12 (Terje Pettersen). 1-3 ind. Sælabonn januar-februar (Terje Pettersen, Kendt Myrmo mfl.). Maks. 3 ind. Sælabonn primo desember (2.12.) (Terje Pettersen). Jevnlig 5-10 ind. Frognøya-Gomnes januar-februar (Terje Pettersen, Kendt Myrmo mfl.), maks. 20 ind. ved Frognøya 27.2 (Terje Pettersen). 2-9 ind. Frognøya desember (Terje Pettersen). RINGERIKE: Maks. 11-12 ind. Nordfjorden-Nakkerud januar-februar (Marius von Glahn, Terje Pettersen mfl.). 2-4 ind. Nordfjorden desember (Terje Pettersen mfl.). Maks. 10 ind. Steinsfjorden nord, Åsa 18.12 (Terje Pettersen). ØVRE EIKER: 1 ind. Sandsbukta, Eikeren nord 16.1 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet 6.12 (Eirik Kristoffersen).

vipe (*Vanellus vanellus*):

* hekkefunn (14 med 24 par), vinterfunn (1)

Vinterfunn 2020: 5 ind. Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 12.1 *(F) (Bent Andersen).

Hekkefunn 2020: DRAMMEN: 3 adult + 3 1K Grunnane 10.7 (Steinar Stueflotten). HEMSEDAL: 1 par paring/kurtise på mulig hekkeplass Lykkja 18.5 (Kristin Devor). HOL: 1 adult med avledningsmanøver + 1 pull drept av katt Oldebråten 7.6 (Trond Bølstad). HOLE: 1 ind. rugende Nordjordet, Steinssletta 28.4 (Marius von Glahn). 4 ind. engstelig adferd, indikasjon på hekking Søhol, Røyse 14.5 (Jostein Bærø Engdal, Kari Mathilde Engdal). KRØDSHERAD: 2 par rugende Søndre Leir, Krøderen 24.5 (Eirik Kristoffersen, Elisabeth Josefine Sommer). LIER: 1 hekking (3 unger utenfor reir, ikke utvokste 4.7.) Jordhaugene, Linnesstranda 29.4-9.7 (Jens Erik Nygård, Hans Petter Rømme). 1 hekking (2 unger utenfor reir, ikke utvokste, trolig mislykket) Nf Jordhaugene, Linnesstranda 8.-30.5 (Jens Erik Nygård). 1 hekking (1+ unge utenfor reir, ikke utvokst 7.6.) Huseby V 11.5-7.6 (Steinar Stueflotten). 1 hekking (1-2 par m/4 unger utenfor reir, ikke utvokste 6.6.) Gilhus, Linnesstranda 30.5-4.7 (Jens Erik Nygård). MODUM: 1+ flygedyktig unger Tørrhaug 5.7 (Marius von Glahn). 2 flygedyktige unger Natvet 5.7 (Marius von Glahn). RINGERIKE: 8 ind. paring/kurtise på mulig hekkeplass Averøya 29.4 (Marius von Glahn). 1 par m/1 unge utenfor reir, ikke utvokst Averøya, Nordfjorden 21.8 (Marius von Glahn). ØVRE EIKER: Hekking 4-5 par (4 unger utenfor reir, ikke utvokste 23.5.) Hegstad, Fiskumvannet 26.4-26.5 (Steinar Stueflotten mfl.). 1 hekking (3 unger utenfor reir, ikke utvokste 10.6 og 1.7) Hegstad beitemark, Fiskumvannet 28.5-1.7 (Steinar Stueflotten mfl.). 9 1K næringssøkende Hegstad beitemark, Fiskumvannet 11.7 (Steinar Stueflotten).

Viper er observert mange steder i egnede hekkebiotoper, men bare de nevnte med bekreftet hekking. Hekkefunnene er gruppert kommunevis for bedre oversikt. Til sammen ble minst 24 unger observert i løpet av hekketida (33 unger i 2019), men uvisst hvor mange av disse som nådde flygedyktig alder. Vipeprosjektet i nedre del av Lier, som er et samarbeidsprosjekt mellom Lier kommune, grunneiere og NOF Drammen og omegn lokallag, ble videreført i 2020. J.E. Nygård og H.P. Rømme merket kun 3 reir av 6 påviste reir/hekkinger denne våren. Resultatene i 2020 ble negativt påvirket av endrede driftsforhold i jordbruket som følge av koronapandemien. På Hegstad i Øvre Eiker ble det ikke merket noen reir i 2020 da vipene gikk til hekking først medio april etter at en tidlig våronn var gjennomført. 4-5 par hekket i området, men trolig lyktes bare 3 par å få fram unger. 9 flygedyktige unger ble observert på Hegstad beitemark 11.7. Et overraskende og sjeldent vinterfunn på Hegstad beitemark i Øvre Eiker 12.1. er interessant, men så var vinteren 2019/2020 også uvanlig mild med barmark på Hegstad medio januar.

tundralo (*Pluvialis squatarola*):

* alle funn (45 - 1/1)

2020: 1 ind. (1K) Linnesstranda, Lier 18.-21.9 (*Steinar Stueflotten, Jorunn Villand, Bent Ellingsen, Jens Erik Nygård mfl.).

Arten opptrer forholdsvis regelmessig, men fåtallig på høsttrekket (august – medio oktober) i nedre deler av Buskerud, sjeldent ellers. Individet på Linnesstranda var skadet i høyre vinge som hang litt ned da den ble oppdaget 18.6. Den kunne fly og etter et par dager så det ut til at vingen var leget slik at den kunne fortsette trekket. Sist en tundralo rastet på Linnesstranda var 1.8.2010.



Tundralo 1K Linnesstranda, Lier 20.09.20. Foto: Steinar Stueflotten

dverglo (*Charadrius dubius*):

* hekkefunn (6)

2020: 2 ind. paring/kurtise på mulig hekkeplass Linnesstranda, Lier 4.5 (Melvin Åsum) og 4 adult paring/kurtise på mulig hekkeplass Linnesstranda, Lier 11.6 (John Sandve). 2 ind. engstelig adferd, indikasjon på hekking Gulsvik massetak, Flå 24.5 (Håkon Gregersen). 1 par engstelig adferd, indikasjon på hekking sandtak på Lamoen, Lamyra, Ringerike 12.6 (Marius von Glahn) og 1 adult + 1 unger utenfor reir, ikke utvokst Lahaugen, Lamyra, Ringerike 31.7 (Marius von Glahn). 1 adult + 2 unger utenfor reir, ikke utvokste Averøya, Ringerike 29.7 (Marius von Glahn). 1 par engstelig adferd, indikasjon på hekking Skjøl, Øvre Eiker 19.6 (Jon Ludvig Hals). 2 ind. engstelig adferd, indikasjon på hekking Onsakerвика, Onsaker, Hole 24.6 (Terje Pettersen).

Fåttallig hekkefugl i nedre deler av Buskerud. Flere observasjoner i hekketiden i passende biotop, men bare de nevnte med påvist/sannsynlig hekking. Observert paring/kurtise flere ganger på Linnesstranda indikerer hekking i nærområdet, trolig på Gilhus eller Gullaug.

boldt (*Charadrius morinellus*):

* alle funn (- 11/39)

2020: 1-8 ind. Røyse Skole, Hole 10.-16.5 (Terje Pettersen, Didrik Løstegård Kristensen, Aksel Olsson mfl.). 2 ind. næringssøkende Svenskerud, Vikersund, Modum 12.5 (Eirik Kristoffersen). 1-10 ind. Flåmyri, Hemsedal 14.-27.5 (maks. 10 ind. 23.5.) (Stian Sannes, Bent Fjeldheim, Magnhild Finset Fjeldheim). 1 ind. Bønsnes, Hole 16.5 (Steinar Stueflotten, Terje Pettersen). 2 ind. Flesaker, Fiskumvannet, Øvre Eiker 17.5 (Jon Ludvig Hals, Andreas Hessvik-Trøite, Steinar Stueflotten). 5 ind. Bergsvingen, Øvre Eiker 17.-19.5 (Steinar Stueflotten, Morten Jagdum, Jørn Lønner, Jostein Bærø Engdal). 1 ind. Halnetunga, Hol 29.5 (Øystein Bjørkelund, Helge Søgnebotten). Minimum 3 ind. Øvre Storebotn, Hemsedal 7.6 (Vegard Bang Fjeldheim, Bent Fjeldheim). 2 ind. V og S for Eimehæe, Hol 14.-15.6 (Frode Falkenberg, Oddvar Heggøy). 3 ind. Krækkjahalli, Hol 15.-16.6 (Frode Falkenberg, Oddvar Heggøy). 1-2 ind. Halnekollen, Hol 20.6-4.7 (Lennart Wam Hansson, Steinar Stueflotten, Arild Gauteplass mfl.).

Arten hekker spredt i høyfjellet i øvre deler av Buskerud, men ingen sikre hekkefunn er rapportert i 2020. Sjelden art i lavlandet på vårtrekket i mai. Gjennomsnittlig ankomstdato: 13.5 ± 7 dager (17 år).

storspove (*Numenius arquata*):

* hekkefunn (3)

2020: 1 ind. sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop Ørterstølen, Golsfjellet, Gol 30.5 (Agnar Målsnes, Gunn Mjelde, Ingunn Løyning, Rune Voie mfl.). 1 ind. sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop Halleflæi, Golsfjellet Syd, Gol 1.6 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Solfrid Åsta Kvam). 2 ind. sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop Lite tjern ved Fv51 847 moh. mot S, Golsfjellet, Gol 3.6 (Torgrim Breiehagen).

Storspova har gått mye tilbake som hekkefugl i Norge de siste 20 årene. I Buskerud har arten forsvunnet som hekkefugl i kulturlandskapet i lavlandet, men noen par hekker fortsatt på myrer og slåttemark på Golsfjellet. De tre refererte observasjonene er alle gode indikasjoner på at arten fortsatt hekker her selv om vellykket hekking ikke ble påvist i 2020.

lappspove (*Limosa lapponica*):

* alle funn (35 - 4/6) LRSK

2020: 3 ind. næringssøkende Sandtangen, Onsaker, Hole 4.5 *(F) (*Terje Pettersen, Tore Westgård). 1 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 10.5 *(F) (Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten). 1 1K Grunnane, Drammen 2.-21.9 *(F) (Steinar Stueflotten, John Apeland, Hans Petter Kristoffersen mfl.). 1 adult hunn næringssøkende Vik, Steinsfjorden, Hole 5.- 6.9 *(F) (*Christine Årdal, Terje Pettersen, Aksel Olsson, Richard Hals Gylseth).

Arten er sjelden i Buskerud, men observeres nesten årlig i lite antall på vårtrekket i april-mai og høsttrekket i august-september. Gjennomsnittlig ankomstdato: $30.4. \pm 13$ dager (17 år). De fleste funn er gjort på Linnesstranda, Fiskumvannet og i Nordre Tyrifjorden. Fuglen på Vik i Hole var fargeringsmerket som voksen hunn i Arnheim, Nederland i 2011.



Lappsøve Vik, Steinsfjorden 06.09.20. Foto: T.Pettersen Polarsnipe 1K Averøya, Ringerike 17.08.20.
Denne hunnen ble fargeringsmerket i Nederland i 2011. Foto: T.Pettersen

polarsnipe (*Calidris canutus*):

* alle funn (34 - 4/8)

2020: 4 ind. næringssøkende Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 5.7 (Terje Pettersen). 1 1K næringssøkende Averøya, Ringerike 17.-18.8 (Terje Pettersen, Marius von Glahn). 2 ind. overflygende Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 24.8 (Terje Pettersen). 1 ind. Grunnane, Drammen 2.9 (John Apeland).

Arten opptrer normalt bare sporadisk og i lite antall på høsttrekket (medio juli – primo oktober), mens observasjoner på vårtrekket i mai er sjeldne.

fjellmyrløper (*Calidris falcinellus*):

* alle funn (5/7 - 1/2) LRSK

2020: 2 ind. Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 2.6 *(F) (Aksel Olsson).

Sjelden art på trekket i Buskerud. De fleste funn er gjort på vårtrekket i siste halvdel av mai. Arten ble sist sett på Huseby i Lier 25.-27.8.2018.

tundrasnipe (*Calidris ferruginea*):

* alle funn (30/50 - 1/1) LRSK

2020: 1 ind. Grunnane, Drammen 19.9 (Frode Nordang Bye, Bent Ellingsen).

Arten observeres sporadisk i lite antall (typisk 1-3 ind.) på høsttrekket (medio juli - september) i nedre Buskerud, oftest 1K fugler. Arten ble sist observert på Karlsrudtangen, Ringerike 30.7.2019.

temmincksnipe (*Calidris temminckii*):

* alle funn (- 8/31)

2020: 1 ind. Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 10.-11.5 (Terje Pettersen, Marius von Glahn). 1 ind. Averøya Strandsone, Nordfjorden, Ringerike 11.5 (Marius von Glahn). 1 ind. Hovsfjorden, Hol 16.5 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). Jevnlig 2-5 ind., maks.10 ind. (23.5) Svarstadvika, Sælabonn, Hole 19.-24.5 (Terje Pettersen). 1-5 ind. Linnesstranda, Lier 20.-30.5 (Hans Petter Rømme, Steinar Stueflotten, Rolf E. Andersen, Jens Erik Nygård mfl.). 2 ind. Juveren, Ringerike 21.5 (Richard Hals Gylseth). 12 ind. Svendsrudvika, Sælabonn, Hole 22.5 (Terje Pettersen). 1 ind. Vatsfjorden øvre, Vats, Ål 23.5 (Torgrim Breiehagen). 1 ind. Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 24.5 (Eirik Kristoffersen). 7 ind. Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 24.5 (Marius von Glahn).

Arten hekker sparsomt i øvre deler av Buskerud, og observeres regelmessig på trekket i nedre deler av fylket, hyppigst på vårtrekket i mai, mer sporadisk på høsttrekket (medio august – september). De fleste trekkobservasjoner er gjort på Linnesstranda (Lier) og i Nordre Tyrifjorden (Ringerike/Hole). Gjennomsnittlig ankomstdato: 15.5. ± 6 dager (35 år). Mange individer på vårtrekket i 2020. Flokkene på to lokaliteter i Sælabonn i mai antas å dreie seg om de samme fuglene.

sandløper (*Calidris alba*):

* alle funn (15/20 - 4/5)

2020: 2 adult Juveren, Ringerike 21.5 (Richard Hals Gylseth). 1 adult Averøya, Ringerike 23.5 (Terje Pettersen). 1 1K Svarstadvika, Sælabonn, Hole 31.8 (Terje Pettersen). 1 1K Karlsrudtangen og Averøya, Nordfjorden,

Ringerike 3.9 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 1K næringssøkende Sandtangen, Onsaker, Hole 4.-10.9 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Steinar Stueflotten).

Sjelden gjest som observeres år om annet på høsttrekket spesielt i Nordre Tyrifjorden (primo august - medio oktober). Sist sett på Linnestranda i Lier 29.07.2015. Ellers meget sjelden gjest på vårtrekket, sist sett i Nordfjorden, Ringerike 22.5.2005. 1K individet som ble sett på Karlsrudtangen, Averøya og Sandtangen primo september, regnes som samme individ, muligens det samme som i Svarstadvika noen dager tidligere.

fjæreplytt (*Calidris maritima*):

* alle funn (- 2/3)

2020: 2 ind. næringssøkende Halnekollen nord, Hol 4.7 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 adult Krækkjahytta, Hol 23.7 (Øyvind Slyk).

Arten hekker spredt i indre fjellstrøk, men få hekkefunn blir rapportert. Meget sjelden å se på trekket i nedre deler av Buskerud. Arten overvintrer regelmessig på skjær i Oslofjorden fra november til medio april, bl.a. utenfor Slemmestad, men slike funn rapporteres ikke lenger her etter at Røyken og Hurum ble en del av Asker kommune.

dvergsnipe (*Calidris minuta*):

* alle funn (- 3/5)

2020: 1 adult næringssøkende Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 26.5 (Morten Hunn). 2 ind. nærings-søkende Sandtangen, Onsaker, Hole 29.7 (Marius von Glahn). 1-2 ind. Grunnane, Drammen 2.-3.9 (Steinar Stueflotten, John Apeland).

Arten observeres nesten årlig i lite antall på høsttrekket (august – september) i nedre deler av fylket, sjeldnere på vårtrekket (mai - primo juni). Nordfjorden (Ringerike) er sammen med Linnestranda (Lier) de beste trekk-lokalitetene for arten i Buskerud. Sist arten ble observert ved Fiskumvannet var 30.8.2014. Arten er ikke tidligere registrert på Grunnane ved Svelvik.

rugde (*Scolopax rusticola*):

* vinterfunn (- 1/1)

2020: 1 ind. Hals, Øvre Eiker 23.-30.12 (Anders Hals).

Vinterfunn av rugde er sjeldne i Buskerud. Lokaliteten på Hals har vist seg å være et godt sted for slike vinterfunn i seinere år.

kvarbekkasin (*Lymnocyrtus minimus*):

* alle funn (- 7/8) LRSK

2020: 1 ind. Hals, Øvre Eiker 11.2 (Anders Hals). 1 ind. Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 6.9 (Jan Olav Nybo), 2 ind. rastende Solberg tjern bekk, Tyristrand, Ringerike 8.10 (Marius von Glahn). 1 ind. Hegstadmyra, Fiskumvannet, Øvre Eiker 12.10 (Steinar Stueflotten). 1 ind. overflygende Synneren sør, Ringerike 21.10 (Terje Pettersen). 1 ind. Spæren, Øvre Eiker 25.10 (Anders Hals). 1 ind. død - ukjent dødsårsak Golsfjellet, Gol 31.10 *(F) (Per Stensland).

Arten observeres hyppigst på høsttrekket fra medio september til medio november. Mer sjeldent om vinteren og på vårtrekket i siste halvdel av april. Fiskumvannet er nå trolig den beste trekklokaliteten for arten i Buskerud. Den fuktige beitemarka på Hegstad har blitt en attraktiv rasteplass for både denne arten og andre bekkasiner på høsttrekket. Funnet på Hals 11.2. er kun det fjerde rapporterte vinterfunnet i Buskerud.

dobbeltbekkasin (*Gallinago media*):

* alle funn (- 18/58)

2020: 1 ind. Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 28.4 (Marius von Glahn). 1 ind. Breiehagen, Strandafjorden, Ål 7.5 (Torgrim Breiehagen). 1 ind. Måsnesmyra, Fiskumvannet, Øvre Eiker 12.5 (Jon Ludvig Hals). 1-8 ind. Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 12.-18.5, maks. 8 ind. 17.5, (Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten, Andreas Hessvik-Trøite mfl.). 1 ind. Fløtagutu, Fekjagranden og Løyte, Ustedalsfjorden, Hol 19.-24.5 (Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass, Trond Bølstad). 1 ind. Hegstadmyra og Hegstad beitemark, Øvre Eiker 19.-26.5 (Jostein Bærø Engdal, Steinar Stueflotten, Jostein Myre, Bjørn Penk mfl.). 1 ind. sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop skjernet lok. Ustedalen, Hol 27.5-3.6 (Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass). 1 ind. Bergsjøen, Ål 28.5 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 ind. Røyseng, Sørums, Ringerike 30.5 (Marius von Glahn). 1 ind. rastende Fagerheim, Hol 1.6 (Rune Voie, Kjetil Mandelid). 9 ind. sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop skjernet lok.1 Ustaoset-området, Hol 14.6 (Frode Falkenberg, Oddvar Heggøy). 7 hanner sang/spill i

[illegible]

A close-up photograph of a Woodcock standing in tall grass and low shrubs. The bird has a long, straight bill and mottled brown and black plumage. A copyright notice '© Jostein Mørø' is visible in the bottom left corner.

21

sotsnipe (*Tringa erythropus*):

* alle funn (85 - 2/3)

2020: 1 ind. Grunnane, Drammen 7.-11.5 (Jostein Bærø Engdal, Terje Pettersen, Steinar Stueflotten mfl.). 2 ind. Grunnane, Drammen 27.5 (Bjørn Penk).

Arten observeres tilnærmet årlig i Buskerud i lite antall på vårtrekket (ultimo april - mai), ofte med en ny trekktopp i juni, og på høsttrekket i august-september. Gjennomsnittlig ankomstdato: 8.5. $\pm$ 7 dager (31 år).

krykkje (*Rissa tridactyla*):

* alle funn (- 3/5)

2020: 1 3K overflygende Røsholmstranda, Nordfjorden, Ringerike 21.2 (Terje Pettersen). 3 ind. Efteløt., Kongsberg 7.11 (Bjørn Roar Skullestad). 1 1K Grunnane, Drammen 7.11 (Steinar Stueflotten).

Arten forekommer relativt hyppig langs kysten av Hurumlandet i vinterhalvåret fra september til februar, spesielt i uværsperioder om høsten, sjelden ellers. Slike funn rapporteres ikke lenger her da de nå tilhører Asker kommune. To innlandsfunn i 2020 er litt spesielt. Arten er ellers sjelden å se på Grunnane ved Svelvik.

hettemåke (*Chroicocephalus ridibundus*):

* hekkefunn (2/40+ par) inkl. kolonier

2020: Ingen hekkefunn er rapportert på AO, men ifm. overvåkingen av hekkende vannfugl i Tyrifjorden ble det 22.6. funnet et reir m/3 egg og et reir m/1 kaldt egg, samt merket 6 pulli på Østbråtaskjæret i Steinsfjorden og sett 80 ad + 59 unger på Småøyene, Steinsfjorden. Den 9.7. ble det observert 99 unger i Steinsfjorden, så sannsynligvis hekket det 40-45 par her i 2020 (pers. medd. Bjørn Harald Larsen og Kendt Myrmo). Sannsynligvis hekket det også noen få par på tak i Drammen sentrum som tidligere år. Hekkefunn i Røyken og Hurum er ikke lenger med i denne rapporten.

dvergmåke (*Hydrocoloeus minutus*):

* alle funn (53/108 - 4/6) LRSK

2020: 3 ind. overflygende Fiskumvannet, Øvre Eiker 21.5 *(F) (*Johs Edvardsen, Jorunn Villand, Steinar Stueflotten). 1 3K+ næringssøkende Fiskumvannet, Øvre Eiker 23.5 *(F) (Brage Bærheim). 1 adult næringssøkende Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 3.6 *(F) (*Kendt Myrmo, Terje Pettersen). 1 1K Fiskumvannet, Øvre Eiker 2.10 (Steinar Stueflotten).

Arten er blitt observert årlig i lite antall de siste årene. De fleste funnene blir gjort om høsten i august - medio oktober, mer sporadisk om våren og sommeren. Gjennomsnittlig ankomstdato: 14.5. $\pm$ 8 dager (12 år). Individet på Fiskumvannet 23.5. kan ha vært ett av de tre individene som ble sett samme sted to dager tidligere.



Dvergmåke Karlsrudtangen, Ringerike 03.06.20. Foto: Kendt Myrmo

fiskemåke (*Larus canus*):

* hekkefunn (13/14 par) inkl. kolonier

2020: 1 ind. reirbygging Vik, Steinsfjorden, Hole 23.4 (Steinar Stueflotten). 1 ind. rugende Steinberg, Drammen 12.5 (Steinar Stueflotten). 1 par rugende Dam, Solhovda, Hol 2.6 (Per Furuseth). 1 hekking (3 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Fosseparken, Kongsberg 3.-11.6 (Aleksander Solberg). 1 hekking (3 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Åsatangen, Åsa, Ringerike 5.6-5.7 (Marius von Glahn). 1 par reirbygging Veslefjorden, Hol 6.6 (Trond Bølstad). 2 ad m/3+3 unger utenfor reir, ikke utvokste Gamlebrua, Kongsberg Sentrum, Kongsberg 9.6 (Morten Jagdum). 1 ind. rugende Jonsetangen, Øyangen, Ringerike 13.6 (Marius von Glahn). 2 pulli unger utenfor reir, ikke utvokste Strømsø, Drammen By, Drammen 26.6 (Steinar Stueflotten). 1 hekking (3 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Gilhus, Linnestranda, Lier 28.6-9.7 (Jens Erik Nygård). 1 hekking (1 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Ringerike Sykehus, Hvervenmoen, Ringerike 3.7 (Marius von Glahn). 1 hekking (3 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Buskerud storsenter, Drammen 3.7 (Jon Ludvig Hals). 3 ind. (1 par + 1 1K) Svartsteintjørne sør, Hol 3.8 (Per Furuseth).

Arten har vært i tilbakegang i seinere år, og LRSK ønsker derfor rapport flest mulig hekkefunn. I tillegg til de nevnte hekkefunnene ble det ifm. overvåkingen av hekkende vannfugl i Tyrifjorden 22.6. observert flere hekkende par og flere fiskemåkeunger i Tyrifjords-området, spesielt i Steinsfjorden. Trolig hekket det også flere par bl.a. på tak på bygninger i Drammen by. Hekkefunn i Røyken og Hurum er ikke lenger med i denne rapporten.

sildemåke (*Larus fuscus*):

* vinterfunn (2)

2020: 1 adult Drammenselva i Drammen, Drammen 10.1 (Bjørn Harald Larsen). 1 ind. Grunnane, Drammen 14.2 (Marius von Glahn).

Sjelden vintergjest i Buskerud.

rovterne (*Hydroprogne caspia*):

* alle funn (6/10 - 1/2) LRSK

2020: 2 ind. Sandtangen, Onsaker, Hole 4.6 *(F) (*Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Didrik Løstegård Kristensen, Egil Ween) og de samme 2 adulte ind. Karlsrudtangen og Averøya, Nordfjorden, Ringerike 4.6 *(F) (Marius von Glahn, Terje Pettersen mfl.).

Arten observeres jevnlig i sommerhalvåret langs kysten av Sør-Norge og er tidligere også funnet hekkende i Østfold. Dette er det 7. godkjente funnet i Buskerud. Arten ble sist sett på Linnestranda i Lier 27.6.2016. De to individene 4.6., muligens et par, ble oppdaget rastende på en sandbanke utenfor Odin camping kl. 15:20. Den ene var fargeringsmerket med rød ring med hvit skrift UA73 på venstre bein. Denne rovterna var blitt merket som reirunge på Ålgsbådarna i Västervik, Småland i Sverige 24.6.2018. De to trakk seinere inn i Nordfjorden og fisket i hele området langs Averøya og Karlsrudtangen.



To rovterner Sandtangen, Onsaker, Hole 04.06.20. Foto: Kendt Myrmo

makrellterne (*Sterna hirundo*):

* hekkefunn (3/3 par); funn i nordfylket (0) LRSK

2020: 1 par paring/kurtise på mulig hekkeplass Østbråtaskjæret, Steinsfjorden, Ringerike 8.5 + 3.6 (Marius von Glahn, Frode Munkhaugen). 1 hekking (4 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Gilhus, Linnestranda, Lier 22.5-9.7 (Jens Erik Nygård). 2 ind. paring/kurtise på mulig hekkeplass Småøyene, Steinsfjorden, Hole 24.5 (Marius von Glahn).

Arten har vist generell tilbakegang i Norge i seinere år, men har klart seg bra i området rundt Hurumlandet i tidligere Buskerud fylke de siste årene. Hekkefunn i tidligere Røyken og Hurum kommuner rapporteres ikke lenger her. Noen få par hekker fortsatt i Steinsfjorden i Hole/Ringerike og på Gilhus i Lier. Flere unger ble observert på hekkeplass i Steinsfjorden 22.6.

lomvi (*Uria aalge*):

* innlandsfunn (- 4/6)

2020: 1-2 ind. på diverse lokaliteter i Tyrifjorden, Hole/Modum/Lier 28.3-22.6 (Terje Pettersen, Bjørn Harald Larsen, Kendt Myrmo, Morten Brandt, Marius von Glahn). 1 ind. Bragernes strand, Drammen By, Drammen 28.10 (Bent Ellingsen). 1-2 ind. på diverse lokaliteter i Tyrifjorden (Frognøya - Nordfjorden), Hole/Ringerike 31.10-11.12 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo mfl.). 1 ind. på diverse lokaliteter i Steinsfjorden, Hole/Ringerike 4.11-18.12 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen).

Sjelden art i innlandet. Som regel er slike observasjoner knyttet til større invasjonene med uvær og sterk vind på kysten. Enkelte lomvier kan da bli drevet/fly inn over land og havne i vann og innsjøer som i Tyrifjorden. En enslig lomvi ble sett sporadisk i Nordre Tyrifjorden i årene 2015-2017 og på nytt i 2019. 1-2 ind. observert på diverse lokaliteter i Nordre Tyrifjorden i 2020, er trolig lomvier som har oversomret i fjorden. Påfyll av nye individer høsten 2020 kan ikke utelukkes.

smålom (*Gavia stellata*):

* hekkefunn (4), vinterfunn (1)

Hekkefunn 2020: 1 ind. rugende skjermet lok.1, Ål 15.6 (Torgrim Breiehagen) og 2 unger utenfor reir, ikke utvokste skjermet lok.1, Ål 26.7 (Torgrim Breiehagen). 1 par m/3 unger utenfor reir, ikke utvokste skjermet lok.2, Hol 21.7 (Ivar Herfindal). 1 adult m/1 unge utenfor reir, ikke utvokst skjermet lok.3, Dagalifjellet, Nore og Uvdal 24.7 (Dag Amundsen, Roy Fjellidal). 1 adult observasjon i hekketid, passende biotop skjermet lok.3, Dagalifjellet, Nore og Uvdal 27.7 (Frode Nordang Bye). 1 par m/mat til 2 unger skjermet lok.4, Skurdalen nord, Hol 1.-19.8 (Jostein Myre).

Vinterfunn 2020: 1 adult + 1 1K Nordfjorden, Ringerike 17.-18.12 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 1K Nordfjorden, Ringerike 22.12 (Terje Pettersen).

Arten hekker spredt i nord- og midtfylket og sees regelmessig på vårtrekket i Tyrifjorden, Drammensfjorden og på Grunnane ved Svelvik, mer sporadisk i lavlandet ellers i nedre deler av Buskerud. Jevnlig 10-24 ind. på Grunnane og opptil 10-17 ind. i Nordfjorden (Tyrifjorden) i april - primo mai. Nøyaktige hekkelokiteter er skjermet til 5x5 km ifølge regler fra Artsdatabanken. En rekordtidlig vårobobservasjon 3.3 ved Tyristrand, Ringerike, jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 11.4. ± 13 dager (25 år). Sjelden vintergjest.

storlom (*Gavia arctica*):

* hekkefunn (8), vinterfunn (0)

Hekkefunn 2020: 1 par m/1 unge utenfor reir, ikke utvokst Øyangen, Ringerike 13.6 (Marius von Glahn). 2 ind. rugende Solheimstøltjønne, Solheimstulen, Nore og Uvdal 21.6 (Bjørn Lauritzen). 1 par m/1 unge utenfor reir, ikke utvokst Solheimstøltjønne, Solheimstulen, Nore og Uvdal 5.7-28.8 (Bjørn Lauritzen, Roy Fjellidal, Dag Amundsen). 1 hekking (1 pulli) unge utenfor reir, ikke utvokst Mykle, Kongsberg 29.6 (Johs Edvardsen, Odd Frydenlund Steen). 1 par m/1 unge utenfor reir, ikke utvokst Samsjøen, Ringerike 13.7 (Marius von Glahn). 1 par m/2 unger utenfor reir, ikke utvokste Synstevann, Buvatn, Nesbyen 27.7 (Rolf E. Andersen). 1 par m/mat til 1 unge Helgevannet, Kongsberg 11.8 (Pål Eid). 2 adult + 1 1K Torsetlia, Nore og Uvdal 19.-20.8 (Bjørn Helge Larsen). 1 adult + 1 1K Slevika, Krødsherad 23.-27.8 (Eirik Kristoffersen, Marius von Glahn).

Vanlig, men spredt og heller fåtallig hekkefugl over det meste av Buskerud. Mange rapporterte hekkefunn i 2019 og 2020. Meget sjelden vintergjest i Buskerud.

gulnebbblom (*Gavia adamsii*):

* alle funn (5/5 - 1/1) LRSK

2020: 1 2K næringssøkende Drammenselva mellom Hokksund bru og Hagaøya, Øvre Eiker 22.2-3.3 (*Geir Tøndel Fossum, Andreas Gullberg, Jostein Bærø Engdal, Lars Dolmen, Anders Hals mfl.). 1 2K næringssøkende Drammenselva ved Steinberg, Drammen 23.2-4.3 (Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten, Arild Johansen mfl.).

Meget sjelden gjest i Buskerud. Innlandsfunn som dette dreier seg normalt om observasjoner i store innsjøer som Tyrifjorden og Mjøsa, så et funn oppe i en stilleflytende elv er meget spesielt! Den unge gulnebbblommen oppholdt seg i Drammenselva mellom Hokksund og Mjøndalen i halvannen uke, noe som trolig skyldtes gode næringsforhold. Den fanget og spiste bl.a. mange sandflyndrer i disse dagene. Denne store lommen ble et meget ettertraktet fotoobjekt med mange flotte bilder publisert på AO.



Gulnebbblom 2K Drammenselva i Hokksund, Øvre Eiker 26.02.20. Foto: Jon Ludvig Hals

gråhegre (*Ardea cinerea*):

* hekkefunn (1)

2020: 4 ind. rugende Rudsengene, Øvre Eiker 29.4 (Steinar Stueflotten, Per Øystein Klunderud).

Fåtallig hekkefugl i Buskerud, men konkrete reirfunn blir sjelden rapportert. Kolonien på Rudsengene/Rud skog i Øvre Eiker er kjent fra tidligere. Ifølge Per Øystein Klunderud skal det ha vært 5 reir i bruk her i 2020.

egretthehre (*Ardea alba*):

* alle funn (21/21- 5/7) LRSK

2020: 2 2K+ næringssøkende Vassbonn, Bergsjø, Modum 26.4 *(F) (*Jon Ludvig Hals, Terje Pettersen). 2 ind. Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 26.4 *(F) (*Andreas Hessvik-Trøite, Lars Dolmen, Jon Ludvig Hals, Aleksander Solberg, Steinar Stueflotten). 2 ind. Vatnebrynnvatnet, Flesberg 29.4-1.5 *(V) (Kine Bringe mfl.). 1 ind. næringssøkende Fiskumvannet, Øvre Eiker 18.5 *(F) (*Ole Bjørn Braathen, Jørn Lønner, Melvin Åsum). 1 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 22.5 *(F) (Stein Edward James Grønning). 1 adult næringssøkende Lillesstranda, Lier 5.6 *(F) (*Stein Edward James Grønning, Steinar Stueflotten).

Egretthegrer er blitt observert årlig i Buskerud de sju siste årene. Rekordmange funn i 2020. Arten blir hyppigst observert i perioden ultimo april til juni, mer sjeldent fra ultimo august til primo september. De fleste funnene er gjort i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem (Hole, Ringerike), Lillesstranda (Lier) og Fiskumvannet (Øvre Eiker). Dette er første gang det er observert to individer sammen i Buskerud. De to individene som ble oppdaget i Vassbonn 26.4, ble gjenfunnet ved Fiskumvannet vel en time etter at de forlot Vassbonn i 16-tida. Det kan godt tenkes at også

de to individene som dukket opp ved Vatnebrynnvatnet tre dager seinere, kan ha vært de samme to egretthegrene. Dette er første observasjon av arten i Flesberg. Individene på Fiskumvannet 18.5. og 22.5. var to forskjellige individer pga. ulik nebbfarge.



Egretthegrer Vassbonn, Bergsjø, Modum 26.04.20. Foto: Jon Ludvig Hals

fiskeørn (*Pandion haliaetus*):

* hekkefunn (9)

2020: 1 par besøker bebodd reir ØE06a, Øvre Eiker 19.4 (Anne Sørensen). 1 par reir med egg eller unger (3 unger i juli) RI12a, Ringerike 19.4-27.7 (Kristin Otterstad). 2 adult mat til unger RO04a, Rollag 1.6 (Lars Sverdrup-Thygeson). 1 ind. rugende RO03a, Rollag 14.6 (Jan Trygve Bollerud). 1 adult reir med 1+ pull NS05a, Nesbyen 29.6 (Steinar Stueflotten). 1 par reir med egg eller unger FÅ03a, Flå 29.6 (Steinar Stueflotten). 1 par reir i bruk ÅL02a, Ål 2.7 (Jens Romslo). Mislykket hekking KO07a, Kongsberg 15.7 (Per Nærbø). 1 par reir med 1+ unge FÅ03a, Flå 17.7 (Steinar Stueflotten). 1 adult reir med 1 unge NS05a, Nesbyen 17.7 (Steinar Stueflotten). 1 par m/2 unger, reir i bruk RO02a, Rollag 23.8 (Per Furuseth).

Kun få hekkefunn er rapportert på AO i 2020. Alle de rapporterte reirene er kjent fra tidligere. Mye forstyrrelser ved reiret KO07 i Kongsberg, resulterte i at hekkingen her ble oppgitt etter klekking. Reiret er nå blitt forsterket med en plattform (pers. medd. Per Nærbø). Ingen hekking ble påvist i noen av de kjente reirene i tidligere Svelvik kommune i 2020 (pers. medd. Jan Gylder).

kongeørn (*Aquila chrysaetos*):

* funn i nedre Buskerud (- 11/14)

2020: 1 1K+ overflygende Hjarnes, Passebekk, Kongsberg 26.1 (Helge Midtgard, Bjørn Roar Skullestad). 1 2K+ overflygende Finnemarka, Øvre Eiker 15.2 (Jon Ludvig Hals). 1 ind. overflygende Landefoss, Kongsberg 16.2 (Fredrik Stige). 2 adult Barmen NR, Kongsberg 21.2 (Finn Gregersen). 1 ind. overflygende Krokskogen, Hole 21.3 (Rune Zakariassen, Anne Stine Zakariassen). 1 ind. overflygende Klunderud, Øvre Eiker 10.4 (Per Øystein Klunderud). 1 2K overflygende Krokskogen, Hole 17.4 (Terje Pettersen). 1 par overflygende Fiskumvannet, Øvre Eiker 19.4 (Steinar Stueflotten, Bjørn Penk, Noah Penk, Jorunn Villand). 1 adult overflygende Fiskumvannet, Øvre Eiker 9.5 (Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten). 1 ind. overflygende Finnemarka, Lier 10.6 (Petter Naess). 2 ind. overflygende Jondalen, Kongsberg 12.7 (Vidar Øverbye, Siw Hagstrøm).

Kongeørna hekker spredt i høyereliggende deler av Buskerud og har i seinere år også etablert seg som hekkefugl i lavlandet i nedre deler av Buskerud. Konkrete hekkefunn/indikasjoner er ikke med i denne rapporten, og nøyaktige lokaliteter er erstattet med navn på større områder når observasjonen kan være gjort i et mulig hekkeområde.

* alle funn (- 45/54)

[illegible]

* alle funn (- 56/63)

[illegible]

* alle funn (1/1 - 1/1) NSKF

Dette er kun det andre funnet av denne sjeldne kjerrhauken i Buskerud. Det første ble gjort på Passebekk i Kongsberg 13.05.2013. Fuglen ved Fiskumvannet ble fotografert i flukt over Hegstad, men ble ikke artsbestemt før bildene ble lagt ut på Facebook-gruppen «ID og fugl!». Enghauk er en sjelden art i Norge med totalt 103 godkjente funn per 2020. Arten er observert nesten årlig i Norge de siste tjue årene, men bare med et fåtalls individer per år. Ny art for Øvre Eiker.



Engshauk 3K+ hunn Hegstad, Fiskumvannet, Øvre Eiker 16.05.20. Foto: Melvin Åsum

ub. kjerrhauk (*Circus sp.*):

* alle funn (- 1/1)

2020: 1 hann Bergsvingen, Øvre Eiker 1.7 (Jorunn Villand).

En ubestemt lys grå hann myrhauk/steppehauk ble fotografert på langt hold fra Bergsvingen sittende på en stokk ute i en åker på andre siden av elva. Bildet er for dårlig til sikkert å kunne artsbestemme fuglen.

glente (*Milvus milvus*):

* alle funn (17/17 - 2/2) LRSK

2020: 1 ind. næringssøkende Gomsrud Avfallsanlegg, Kongsberg 11.5 *(F) (Bjørn Roar Skullestad). 1 adult overflygende Linnesstranda, Lier 28.6 *(F) (Jorunn Villand).

Sjelden gjest som oftest blir observert på vårtrekket i april-mai. Glenter blir nå observert stadig hyppigere i Norge, så også i Buskerud. Arten er med unntak av 2015, blitt observert årlig i Buskerud siden 2011.

havørn (*Haliaeetus albicilla*):

* alle funn (- 26/28)

2020: 1 ind. Mile Avfallsplass, Mjøndalen, Drammen 2.1 (Glenn Brownlee). 1 ind. overflygende Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2.1 (Bent Andersen). 1 ind. overflygende Drammenselva i Hokksund, Øvre Eiker 29.2 (Reidar Myhre, Bjørn Einar Sakseid). 1 2K+ Engersand, Lier 4.3 (Tore Gunnarsen). 2 ind. overflygende Grunnane, Drammen 4.3 (Eli Gates). 1 ind. overflygende Drammenselva v/Steinberg, Drammen 5.3 (Eli Bondlid). 1 adult overflygende Sandøra, Hokksund, Øvre Eiker 5.3 (Jens Magnussen). 2 adult overflygende Skaret, Hole 13.3 (Geir Sverre Andersen). 1 2K+ overflygende Grøterudodden, Ringerike 19.3 (Tore Gunnarsen). 1 adult overflygende Linnesstranda, Lier 3.4 (Jorunn Villand). 2 ind. overflygende Grunnane, Drammen 4.4 (Eli Gates). 1 ind. overflygende Sygardsslåtta, Hemsedal 8.4 (Bent Fjeldheim). 1 2K overflygende Skaustubben, Hole 11.4 (Jens Tøndel Fossum, Michelle Fossum). 1 ind. overflygende Tolpinrudsvingen, Åsa, Ringerike 11.4 (Marius von Glahn). 1 adult Råen, Krødsherad 18.4 (Marius von Glahn). 1 adult overflygende Lauvdalsbrea, Lauvdalen, Ål 25.4 (Bård Kyrkjedelen). 1 ind. Torpo, Ål 29.4 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 3K overflygende Breie, Strandafjorden, Ål 13.5 (Torggrim Breiehagen). 1 ind. Hovsfjorden, Hol 25.5 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 2K overflygende Lierskogen, Lier 9.6 (Moisés Peregrina). 1 2K+ overflygende Hafnor, Domholt, Hole 20.7 (Marius von Glahn). 1 1K overflygende Sveinhaugbrua, Strandafjorden, Ål 26.10 (Torggrim Breiehagen, Anne Mette Monclair). 1 ind. Petter Hugsteds vei 1, Kongsberg 4.11 (Finn Gregersen). 1 adult Strandafjorden øvre, Ål 5.-6.11 (Leif Gunnar Utgård, Torggrim Breiehagen). 1 adult Strandafjorden øvre, Ål 25.11 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 adult Småøyene, Steinsfjorden, Hole 13.12 (*Kendt Myrmo, Terje Pettersen).

hornugle (*Asio otus*):

* hekkefunn (7), vinterfunn (20 - 0)

2020: 1 hekking (2 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Hegstad, Fiskumvannet, Øvre Eiker 12.6-2.7 (Jon Ludvig Hals, Lars Dolmen, Steinar Stueflotten, Melvin Åsum mfl.). 1 hekking (2-3 pulli) lokkelyd, øvrige lyder Råen/ Fiskum gamle kirke, Fiskumvannet, Øvre Eiker 15.6-1.7 (Lars Petter Marthinsen, Steinar Stueflotten mfl.). 1 hekking (6 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Kilemoen, Hensmoen, Ringerike 20.-24.6 (Terje Pettersen). 2 1K lokkelyd, øvrige lyder Svenskerud, Vikersund, Modum 23.-26.6 (Steinar Stueflotten, Eirik Kristoffersen). 2 1K lokkelyd, øvrige lyder Bråtan, Åmot, Modum 24.6 (Steinar Stueflotten). 1 pulli lokkelyd, øvrige lyder Tamburhaugen, Åmotveien, Lier 25.6 (Steinar Stueflotten). 3-5 1K lokkelyd, øvrige lyder Vølstad og Bryn, Hokksund, Øvre Eiker 27.6-2.7 (Lennart Wam Hansson, Steinar Stueflotten mfl.).

Arten hekker fåtallig, vanligst i gode smågnagerår. I seinere år er det årlig gjort 1-4 hekkefunn av arten i Buskerud. I 2020 ble tiggende unger observert på hele 7 lokaliteter, noe som indikerer et godt hekkeår for arten. Vinterfunn er relativt sjeldne, ingen slike er kjent i 2020.

jordugle (*Asio flammeus*):

* hekkefunn (1), vinterfunn (10 - 1)

2020: 1 par paring/kurtise på mulig hekkeplass mellom Haugastøl og Ustaoset, Hol 29.5 (Agnar Målsnes, Gunn Mjelde, Ingunn Løyning, Ingvar Måge, Kjetil Mandelid, Rune Voie, Solfrid Åsta Kvam). 1 ind. Jondalen, Kongsberg 23.12 (Thomas Taksdal, Marthe Tinlund).

I tillegg til det ene sannsynlige hekkefunnet ble jordugler observert på tre andre mulige hekkeplasser i Hol og Ål i juni, men uten sikker hekkeindikasjon. Vinterfunn er sjeldne.

hubro (*Bubo bubo*):

* alle funn (- 1/1) LRSK

2020: 1 2K- hann syk Stryken Grustak, Ryggkollen, Drammen 14.12 *(F) (Anders Hals).

Det gjøres kun et fåtall sporadiske observasjoner av hubro i Buskerud, men nesten årlig og oftest i vinterhalvåret. Det antas at ca. 5 par fortsatt kan hekke i fylket. Hubroen i Stryken grustak ble funnet av Tron Gevelt. Fuglen var syk og kunne fanges inn av Anders Hals som fikk melding om funnet. Hubroen døde seinere samme dag. Aldersbestemt som død til en ungfugl av Roar Solheim. Sist arten ble observert i nye Drammen kommune var på Vinnes i tidligere Nedre Eiker kommune, faktisk på samme dato 14.12. i 2008.

lappugle (*Strix nebulosa*):

* alle funn (21/28 - 4/4) LRSK

2020: 1 ind. Busundevja/Busund, Ringerike 29.1 *(F) (Terje Kvalvik). 1 4K Røsholmstranda, Nordfjorden, Ringerike 3.-6.3 *(F) (*Marius von Glahn, Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Aksel Olsson). 1 ind. Kulerud, Ringerike 30.3 *(F) (Kristoffer Ryeng). 1 ind. Markmoen S, Snarum, Modum 8.6 *(F) (Åge Marberg).

Sjelden art i Buskerud som oftest blir observert i vinterhalvåret fra september til mars. Arten ble påvist hekkende for første gang på Ringerike i 2017, og hekket i det samme området også i 2018. Dette var begge gode smågnagerår. Lappugla på Røsholmstranda primo mars ble aldersbestemt til 4K av Roar Solheim. Den skal ha blitt sett på Røsholmen ca. en uke før den ble oppdaget på Røsholmstranda og fotografert på Røsholmen også etter 6.3. Seinere skal den visstnok ha blitt fotografert og filmet ved Helgelandsmoen i Hole kommune. Men ingen av disse tilleggsobservasjonene er blitt sikkert bekreftet. Mye tyder på at denne lappugla har oppholdt seg i dette området i ca. 3 uker, og det kan godt ha vært den samme som ble fotografert ved Busund 29.1. og ved Kulerud 30.3.



Lappugle 4K Røsholmstranda, Ringerike 05.03.20.
Foto: Terje Pettersen

hærfugl (*Upupa epops*):

* alle funn (46 - 2/2)

2020: 1 ind. Tolpinrud, Hønefoss By, Ringerike 27.4 (Aina Therese Eide Solli). 1 ind. Li Vf Skotselv, Øvre Eiker 18.9 (Per-Ivar Lund).

Arten observeres kun sporadisk i Buskerud, men er sett årlig siden 2015. De fleste funn blir gjort om våren (ultimo april – mai) og høsten (august - november). Siden dette er en art med særpreget utseende som mange legger merke til i kulturlandskapet, blir mange funn meldt inn av andre personer enn de mer aktive fuglekikkerne, noe som også var tilfellet med årets to funn.

isfugl (*Alcedo atthis*):

* alle funn (96 - 13/15)

2020: 1 ind. Tårnet, Fiskumvannet, Øvre Eiker 9.4 (Ole Bjørn Braathen, Jon Ludvig Hals). 1 ind. Linnesstranda, Lier 11.4-22.5 (Svein Dale, Rolf E. Andersen, Jens Erik Nygård, Steinar Stueflotten, Melvin Åsum mfl.). 1 adult Rankedal naturreservat, Viul, Ringerike 10.6 (Marius von Glahn). 1 ind. Bacheparken, Landfalløya, Drammen 9.7 (Ken Adelsten Jensen). 1 ind. Linnesstranda, Lier 13.7-19.9 (Jorunn Villand, Steinar Stueflotten, Melvin Åsum, Jens Erik Nygård mfl.). 1 ind. Øyen, Hostvedt, Kongsberg 28.-30.7 (Bjørn Roar Skullestad). 1 ind. Holselva, Kleivi, Ål 6.8 (Ivar Lien). 1 adult død - kollisjon med vindu Buskerud Landbruksskole, Åmot, Modum 18.8 (Audun Jahren). 1 ind. Tronstad, Lier 28.8 (Per Håkon Celius). 1 ind. Tårnet, Fiskumvannet, Øvre Eiker 29.8 (Lars Dolmen, Jorunn Villand). 1 adult næringssøkende Lierelva (Nordelva) ved Korsrud, Lier 31.8 (Øystein Engen). 1-2 ind. Linnesstranda, Lier 20.9-26.11 (Jens Erik Nygård, Ole Bjørn Braathen, Steinar Stueflotten, Jorunn Villand mfl.). 1 ind. Grunnane, Drammen 26.10 (Steinar Stueflotten). 2 ind. Linnesstranda, Lier 14.12 (Steinar Stueflotten).

Mange observasjoner de siste årene, og med rekordforekomst på minst 13 funn i 2020. 79 % av observasjonene ble gjort i 2. halvår. I tillegg til de nevnte funnene ble det også gjort flere observasjoner av isfugler i området Åros-Sætre-Storsand, nå en del av Asker kommune. De mange observasjonene langs Lierelva både i 2019 og 2020 kan tyde på hekking et sted oppe i Lierdalen de siste årene. Både den 20.9. og 27.9. ble det observert 2 isfugler sammen på Linnesstranda, og det antas at de fleste av isfuglene som ble observert her i 2020, dreier seg om de samme individene. Isfuglen som ble drept i kollisjon med et vindu på Åmot 18.8. forsvant, men dukket seinere opp igjen i en fryser på Solumsmoen og ble overlevert til Agder museum (ref. Audun Jahren på Facebook). Observasjoner i øvre deler av Buskerud, som det i Holselva på Kleivi i Ål, 6.8., er sjeldne. Observasjonen på Grunnane er det første kjente funnet av isfugl i tidligere Svelvik kommune.



Isfugl Linnesstranda, Lier 27.09.20. Foto: Jens Erik Nygård

* hekkefunn (4)

Fåttallig hekkfugl i Buskerud. Det er gjort flere observasjoner av dvergspett i hekketiden i passende hekkebiotop bl.a. på Linnesstranda (Lier) våren 2020, men uten at hekking ble sikkert påvist.

* vinterfunn (11/12 - 1/1)

Sjelden vintergjest i Buskerud, sist observert på Domholt, Hole 27.1-13.2.2017. Flere observasjoner i nedre Buskerud i januar 2021.

* vinterfunn (19 - 3/3)

2020: 1 ind. Berg, Bergsvingen, Øvre Eiker 16.12 (Steinar Stueflotten). 1 adult hann Sandsæter, Ringerike 24.12 (Terje Pettersen). 1 ind. Trytsjø, Votndalen, Rollag 25.12 (Nikolai Aarseth Krøgenes).

Sjelden vintergjest i Buskerud.

* alle funn (- 65/90), hekkefunn (3)

2020: DRAMMEN: 1 ind. Grunnane 11.5 (Kenneth Lunna, John Apeland). 1 adult Grunntjern V, Viksetra 12.8 (Steinar Stueflotten). FLESBERG: 1 ind. Engerud 16.5 (Henning Anker Johansen). GOL: 1 adult Tuppeskogen 22.7 (Øivind Wathne Johannessen). HOLE: 1 ind. Svarstadvika og Svendsrudvika, Sælabonn 24.5 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Steinsvika og Hårum 14.-16.6 (Marius von Glahn, Aksel Olsson). 2 adult Hundstad, Røyse 12.8 (Didrik Løstegård Kristensen). 1 adult Søhol, Røyse 31.8 (Marius von Glahn). 1 ind. Stein, Steinssletta 4.9 (Terje Pettersen). 2 adult Svendsrudvika, Sælabonn 8.9 (Terje Pettersen). KONGSBERG: 1 ind. Meskestad 17.7 (Trond Ove Stakkeland). 3 ind. Lyngås, Efteløt 24.7 (Bård Engelstad). 1 1K Rudsmoen 30.7 (Aleksander Solberg). LIER: 1 ind. Engersand 10.5 (Tore Gunnarsen). 1 ind. Linnesstranda 10.-12.5 (Jens Erik Nygård, Bjørn Penk, Hans Petter Rømme). 1 ind. Lierskogen 9.6 (Moisés Peregrina). 1 ind. Linnesstranda 15.7 og 22.7 (Bjørn Penk, Jorunn Villand). 2 ind. Linnesstranda 3.-16.8 (Jorunn Villand, Hans Petter Rømme mfl.). 2 1K Engersand 15.8 (Tore Gunnarsen). 1 adult Pålslud 30.8 (Rolf E. Andersen). MODUM: 1 adult Vikersund 3.5 (Stein Edward James Grønning). 1 ind. Hval, Vikersund 24.6 (Eirik Kristoffersen). RINGERIKE: 30 funn av 45 ind. i perioden 5.5-19.9. 90 % av alle funn er gjort i nordre Tyrifjorden-området. To mulige hekkinger. ØVRE EIKER: 15 funn av 20 ind. i perioden 4.5-27.9. 10 av funnene er gjort ved Fiskumvannet. En mulig hekking.

[illegible]

Arten er tidligere påvist hekkende på et tjuetalls lokaliteter i Buskerud og sees jevnlig i sommerhalvåret i nedre deler av Buskerud. 75 % av alle observasjoner er gjort i kommunene Hole, Ringerike og Øvre Eiker. Flere av observasjonene i bl.a. Lier, i Hole/Ringerike og i Øvre Eiker dreier seg trolig om de samme individene. Det ble påvist tre mulige hekkinger i 2020, og flygedyktige kull ble sett på fire lokaliteter. Observasjonene er gruppert kommunevis for bedre oversikt, og for Ringerike og Øvre Eiker med mange funn er det bare gitt et sammendrag av observasjonene. Observasjoner i øvre deler av Buskerud, som det på Gol, er sjeldne. Første observasjon 4.5. jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 4.5. ± 9 dager (33 år).

* alle funn (- 12/13) derav hekkefunn (2)

2020: 2 ind. skjermet lok., Hol 7.2 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 hunn skjermet lok. Norefjell, Sigdal 21.2 (Frode Steffensen). 1 ind. observasjon i hekketid, passende biotop skjermet lok. Nordfjella, Ål 25.4 (Bård Kyrkjedelen). 1 ind. skjermet lok.1 Hardangervidda Ø, Nore og Uvdal 26.6 (Bjørn Lauritzen). 1 ind. skjermet lok.2 Hardangervidda, Nore og Uvdal 24.7 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning). 1 ind. engstelig adferd, indikasjon på hekking skjermet lok.1 Hardangervidda Ø, Nore og Uvdal 1.8 (Bjørn Lauritzen). 1 ind. Vallo, Ål 17.8 (Ola Vaagan Slåtten). 1 1K ptS Holværvatnet, Hol 4.9 (Jostein Myre). 1 adult Tuva, Hol 9.9 (Dag Amundsen). 1 1K Grønenuten,

* alle funn (11/11 - 1/1) LRSK

I Norge blir pirol observert årvisst på Østlandet og med Vestfold og Telemark som det best fylket. Trolig er arten også en uregelmessig hekkefugl i dette området. Alle pirol-observasjoner i Buskerud er gjort i tidsrommet ultimo mai til primo juli, sist observert på Klunderud gård i Øvre Eiker 30.5.2011.

* hekkefunn (2)

Arten hekker årlig i nedre deler av Buskerud, men sikre hekkefunn blir sjelden rapportert. De to angitte funnene er gode indikasjoner på hekking i disse to områdene i 2020.

* alle funn (- 29/49)

JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

A photograph of two black birds, likely crows or ravens, standing in a field of tall, dry grass. The birds are positioned one behind the other, both facing left. They have dark, glossy feathers and light-colored beaks. The grass is a mix of yellow and green, with some blades reaching up to the birds' heads. The background is a soft-focus expanse of similar grass.

34

sanglerke (*Alauda arvensis*):

* vinterfunn (1)

2020: 1 ind. Hals, Øvre Eiker 22.2 (Anders Hals).

Arten er sjelden å se i Buskerud om vinteren. De fleste vinter-observasjoner gjelder tidlig ankomne fugler på vårtrekket i slutten av februar. Det foreligger kun 3 egentlige vinterfunn i Buskerud observert tidligere enn 15.2.

fjellerke (*Eremophila alpestris*):

* alle funn (- 9/17)

2020: 4 ind. Joleimsmyra øst, Hemsedal 9.4 (Bent Fjeldheim, Magnhild Finset Fjeldheim). 3 ind. Jorder vest for Birkelund, Hovsfjorden, Hol 2.5 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 ind. sang/spill Øvre Storebotn, Hemsedal 7.6 (Vegard Bang Fjeldheim, Bent Fjeldheim). 1 hekking (3 1K) mat til unger Halnekollen, Hol 20.6-18.8 (Lennart Wam Hansson, Steinar Stueflotten, Arild Gauteplass, Jostein Myre mfl.). 1 hann sang/spill Ustetind, Hol 24.6 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 ind. Halnekollen nord, Halnekollen, Hol 4.7 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 2 ind. observasjon i hekketid, passende biotop Nappen, Langesjøen, Nore og Uvdal 24.7 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning). 3 1K Ustaoset, Hol 6.8 (Hans Peter Melby). 1 ind. Nystrand, Hallingby, Ringerike 30.10 (Marius von Glahn).

Arten hekker spredt i høyfjellet i øvre deler av Buskerud og sees bare sporadisk i lavlandet på vårtrekket (april-mai), mer sjeldent på høsttrekket (ultimo september - november). Gjennomsnittlig ankomstdato: 26.4. ± 16 dager (18 år). Verdt å nevne er også et sjeldent vinterfunn på Lahellholmen i Asker, tidligere Røyken kommune, 2.1 (Jorunn Villand).

gulbrynsanger (*Phylloscopus inornatus*):

* alle funn (9/10 - 5/5) LRSK

2020: 1 ind. ringmerket Søre Finset, Hemsedal 19.9 *(F) (Bent Fjeldheim, Magnhild Finset Fjeldheim, Per Furuseth). 1 ind. ringmerket Søre Finset, Hemsedal 23.9 *(F) (Bent Fjeldheim). 1 ind. ringmerket Søre Finset, Hemsedal 25.9 *(F) (Bent Fjeldheim). 1 ind. ringmerket Søre Finset, Hemsedal 6.10 *(F) (Vegard Bang Fjeldheim, Stine Bang Fjeldheim, Bent Fjeldheim). 1 ind. ringmerket Søre Finset, Hemsedal 10.10 *(F) (Bent Fjeldheim, Vegard Bang Fjeldheim, Olav Huso).

Meget sjelden gjest på høsttrekket (17.9. - 10.10.) i Buskerud. Dette er faktisk tredje året på rad at gulbrynsangere er blitt fanget og ringmerket på Søre Finset i Hemsedal i perioden ultimo september - primo oktober. Individet ble også ringmerket samme sted 3.10.2015 og 17.9.2009. Hele 10 av totalt 14 observerte gulbrynsangere i Buskerud er blitt fanget og ringmerket i Hemsedal. Rekordmange 5 ind. ringmerket her i 2020!



Gulbrynsanger ringmerket på Søre Finset, Hemsedal 19.09.20. Foto: Per Furuseth

gransanger (*Phylloscopus collybita*):

* vinterfunn (0 - 1/1)

2020: 1 ind. Averøyveien, Synneren, Ringerike 7.12 (Terje Pettersen).

Meget sjelden vintergjest i Buskerud. Dette er faktisk det første kjente vinterfunnet av gransanger i gamle Buskerud fylke. Individet tilhørte trolig en av de østlige underartene, muligens ua. *tristis*.

trostesanger (*Acrocephalus arundinaceus*):

* alle funn (1/1 - 1/1) NSKF

2020: 1 hann sang/spill, ikke hekking Råen, Fiskumvannet, Øvre Eiker 14.-16.6 *(FL) (*Bjørn Roar Skullestad, Helge Midtgard, Jon Ludvig Hals mfl.).

Sjelden sommergjest i Norge med 132 godkjente funn per 2020. Dette er kun det andre funnet av arten i Buskerud. Det første ble også gjort ved Fiskumvannet 11.7.1993 da Anders Hals fanget og ringmerket 1 ind. på Furua. Mange observatører fikk høre den sjeldne kjersangeren på Råen, inntil et kraftig regnvær utpå dagen den 16. juni satte en stopper for besøket.

sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*):

* alle funn (- 5/5)

2020: 1 ind. Stein, Steinssletta, Hole 3.6 (Terje Pettersen, Marius von Glahn). 1 ind. sang/spill Hungerholt, Steins-sletta, Hole 10.-13.6 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Jørn Lønner). 1 ind. sang/spill Måsnesmyra, Fiskumvannet, Øvre Eiker 10.-12.6 (Thorstein Holtskog, Jostein Myromslien, Lars Dolmen, Jon Ludvig Hals). 1 ind. sang/spill Steinsvika, Hole 17.6 (Aksel Olsson). 1 ind. sang/spill Synneren, Ringerike 25.-27.6 (Terje Pettersen). 1 1K Måsnesmyra N, Fiskumvannet, Øvre Eiker 8.8 (Jon Ludvig Hals). 1 ind. Mælingen, Ringerike 18.8 (Marius von Glahn).

Arten er relativt sjelden i Buskerud, men observeres årlig i lite antall. De fleste observasjonene blir gjort i mai-juni, mer sporadisk på høsttrekket i august-september. Gjennomsnittlig ankomstdato: 18.5. ± 7 dager (28 år). Sivsangerne som ble observert ved Stein, Hungerholt og Steinsvika i juni, antas å være samme individ.

busksanger (*Acrocephalus dumetorum*):

* alle funn (16/17 - 3/3) LRSK

2020: 1 ind. sang/spill Hesleberg-Gagnum, Ringerike 8.-13.6 *(L) (*Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Didrik Løstegård Kristensen mfl.). 1 ind. sang/spill Nordbyhaugen, Hals, Øvre Eiker 13.6 *(L) (Lars Dolmen, Jon Ludvig Hals). 1 ind. sang/spill Bryn-Vølstad, Øvre Eiker, Øvre Eiker 20.6-2.7 *(L) (Steinar Stueflotten, Jon Ludvig Hals, Bjørn Penk mfl.).

Sjelden østlig nattsanger som er blitt observert enkelte år i perioden ultimo mai til primo juli, de fleste i første halvdel av juni. Tre funn samme år er uvanlig for denne arten.

myrsanger (*Acrocephalus palustris*):

* alle funn (- 33/55)

2020: DRAMMEN: 1 ind. sang/spill Tømmeråsjordet, Svelvik 5.6 (Frode Bye). 1 ind. sang/spill Undelsrud 11.6 (Hans Petter Kristoffersen). HOLE: 14 funn av 18 ind. i perioden 26.5-27.7. De fleste observasjoner i Steinssletta-området. Den 16.6. ble det observert 2 ind. med reirmateriale i nebbet på Hårum (Aksel Olsson). 2 syngende ind. ble hørt både i Svarstadvika og Onsakervika i slutten av juni. KONGSBERG: 1 ind. sang/spill Øyen 7.6 (Bjørn Lauritzen). 1 ind. sang/spill Kongsberg golfbane, Sjøttvet 3.7 (Bjørn Lauritzen). LIER: 1 ind. sang/spill Linnestranda 27.5-13.7 (Bent Ellingsen, Jorunn Villand, Rolf E. Andersen, Jens Erik Nygård, Steinar Stueflotten mfl.). 1 adult hann sang/spill Gilhus, Linnestranda 13.-20.6 (Jens Erik Nygård). 2 hann sang/spill Linnestranda 14.-17.6 (Jens Erik Nygård, Jorunn Villand). 1 1K Linnestranda 14.8 (Noah Penk, Bjørn Penk). MODUM: 1 ind. Hval, Vikersund 26.6 (Eirik Kristoffersen). 2 ind. sang/spill Tørrhaug 5.7 (Marius von Glahn). 2 ind. lokkelyd, øvrige lyder Jaren 5.7 (Eirik Kristoffersen). RINGERIKE: 1 ind. sang/spill Vaker 9.-16.6 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Marius von Glahn, Jens Tøndel Fossum, Steinar Stueflotten). 1 ind. sang/spill Mælingen 10.6 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo). 1 ind. sang/spill Sørliveien N og Hesleberg 11.-20.6 (Marius von Glahn, Terje Pettersen, Kendt Myrmo). 1 ind. sang/spill Åsaveien/Vollgata, Vaker 20.-24.6 (Terje Pettersen). 1 ind. næringssøkende Lerberg, Ask 15.8 (Terje Pettersen). ØVRE EIKER: 15 funn av 32 ind. i perioden 23.5-29.8. 12 av de 15 funnene er gjort ved Fiskumvannet, de øvrige ved Vestfosselva mellom Berg og Langebru. Den 8.8. observerte Jon Ludvig Hals til sammen 16 ind. i nordenden av Fiskumvannet, derav 13 1K individer. Dette bekrefter at flere par må ha hekket i området denne sommeren.

svarttrødstjert (*Phoenicurus ochruros*):

* alle funn (35/38 - 2/2) LRSK

2020: 1 hann Medhus, Hol 16.4 *(F) (Søndre Søndrål Slettemoen). 1 hunnfarget Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 18.-22.10 *(F) (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Aksel Olsson, Richard Hals Gylseth).

Sjelden gjest i Buskerud, selv om arten er blitt observert årlig siden 2012 og med flere funn hvert år de siste årene. De fleste observasjonene blir gjort på vårtrekket i april-mai, mer sjeldent på høsttrekket medio september-primo november. Sommerfunn i juni-juli er sjeldne. Gjennomsnittlig ankomstdato: 22.4 ± 13 dager (20 år). Observasjoner i øvre deler av Buskerud, som det i Hol, forekommer overaskende ofte. Faktisk er 39 % av alle funn gjort her.

svartstrupe (*Saxicola rubicola*):

* alle funn (16/16 - 9/9) LRSK

2020: 1 hunn Drammenselva v/Steinberg, Drammen 3.3 *(F) (Jerry Skogbeck). 1 2K+ hann ptØ Tårnet, Fiskumvannet, Øvre Eiker 28.3 *(F) (Jon Ludvig Hals). 1 2K+ hann Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 5.4 *(F) (*Lars Dolmen, Aleksander Solberg, Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten). 1 hunn Liabru, Sør-Skurdalen, Hol 6.-7.4 *(F) (*Per Furuseth, Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass). 1 hann sang/spill, ikke hekking Hegstad, Fiskumvannet, Øvre Eiker 8.-12.4 *(F) (*Steinar Stueflotten, Jon Ludvig Hals, Jostein Myre mfl.). 1 hann Tangane, Strandafjorden, Ål 9.4 *(F) (*Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 hann Røsholmstranda, Ringerike 11.4 (Jørn Lønner). 1 hann Nødre kanal, Kleivi, Strandafjorden, Ål 3.5 *(F) (*Torgrim Breiehagen, *Anne Mette Monclair, Per Furuseth, Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 hann Fossgårdfeltet, Geilo, Hol 7.5 (Trond Bølstad).

Sjelden gjest i Buskerud som oftest blir observert på vårtrekket i mars - april, mer sjeldent på høsttrekket i oktober. Rekordmange funn i 2020. Gjennomsnittlig ankomstdato: 26.3 ± 20 dager (11 år). Observasjonen på Steinberg 3.3. er blant de tidligste som er gjort av arten i Buskerud. Pga. forskjeller i fjærdrakten må de tre svartstrupene ved Fiskumvannet ha vært tre forskjellige individer.

sørlig gulerle (*Motacilla flava flava*):

*alle funn (6/6 - 1/1) LRSK

2020: 1 adult hann Tårnet, Fiskumvannet, Øvre Eiker 9.5 *(F) (Steinar Stueflotten).

Meget sjelden underart av gulerle i Buskerud som blir observert år om annet på vårtrekket i mai - primo juni. Siste godkjente funn ble gjort på Eikreslåttane i Hemsedal 1.5.2017.



Sørlig gulerle hann Fiskumvannet, Øvre Eiker 09.05.20. Foto: Steinar Stueflotten

sitrønerle (*Motacilla citreola*):

* alle funn (0 - 1/1) LRSK

2020: 1 adult hann overflygende Fiskumvannet, Øvre Eiker 10.5 (Jon Ludvig Hals).

Østlig erleart med hovedutbredelse i Sibir og Sør-Russland som nå observeres årlig i Norge i lite antall, hyppigst i trekketidene vår og høst. Ny art for Buskerud og Øvre Eiker! Det kan imidlertid nevnes at en sitrønerle hann ble observert og fotografert på Kinn ved Grunnane i gamle Svelvik kommune, nå Drammen kommune, 19.4.2019.

vintererle (*Motacilla cinerea*):

* vinterfunn (6/6 - 1/1)

2020: 1 1K+ overflygende Stensetøya, Krokstadelva, Drammen 25.12 (Jon Ludvig Hals).

Vintererle ankommer ofte tidlig (ultimo mars) og drar igjen seint (oktober), men er sjelden å se om vinteren. Siste kjente vinterobservasjon ble gjort på Linnestranda (Lier) 19.2.2015.

linerle (*Motacilla alba*):

* vinterfunn (- 2/2)

2020: 1 ind. Grunnane, Drammen 14.2 (Marius von Glahn). 1 ind. Strandpromenaden, Vikersund, Modum 18.12 (Eli Bondlid).

Vinterfunn av linerler i desember-februar forekommer sporadisk i milde vintre. Sist observert i desember 2018.

svartryggerle (*Motacilla alba yarrellii*):

* alle funn (23/24 - 2/2) LRSK

2020: 1 ind. Joleimsmyra øst, Hemsedal 11.4 *(F) (Bent Fjeldheim). 1 ind. Søre Finset, Hemsedal 18.4 *(F) (Bent Fjeldheim, Magnhild Finset Fjeldheim).

Den mørke underarten til vår egen linerle sees av og til på vårtrekket i april - medio mai, en sjelden gang også høst og vinter. Gjennomsnittlig ankomstdato: 12.4 ± 11 dager (13 år). Observasjoner i øvre deler av Buskerud, som de to i Hemsedal, er ikke uvanlig.

heiplerke (*Anthus pratensis*):

* vinterfunn (2/101 - 1/1)

2020: 1 ind. næringssøkende Selte, Steinssletta, Hole 6.12 (Terje Pettersen).

Sjelden vintergjest i Buskerud. Det er bare kjent to tidligere vinterfunn i vårt område: fra Hals. Øvre Eiker 7.12.2006 og Østnestangen i tidligere Hurum kommune 19.12.1999.

lappiplerke (*Anthus cervinus*):

* alle funn (9/9 - 1/1) LRSK

2020: 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Sem, Øvre Eiker 30.9 (Geir Sverre Andersen).

Sjelden trekkgjest i Buskerud, der 7 av 10 funn er gjort på høsttrekket (ultimo august - september). Sist observert på Karlsrudtangen (Ringerike) 31.8.2018. Lappiplerke er en art som oftest blir identifisert på karakteristisk fluktlyd av erfarne observatører som kjenner arten godt fra tidligere.

skjærpiplerke (*Anthus petrosus*):

* alle funn (- 5/8)

2020: 1 ind. Måsnemyra, Fiskumvannet, Øvre Eiker 22.3 (Jon Ludvig Hals, Bjørn Lauritzen). 1 ind. Gilhusodden, Linnestranda, Lier 25.3 (Jorunn Villand). 1 ind. Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 28.3 (Jon Ludvig Hals). 1-3 ind. Liabru, Sør-Skurdalen, Hol 1.-6.4 (Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass, Per Furuseth). 1-2 ind. Veslefljorden, Hol 8.-11.4 (Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass, Trond Bølstad).


Arten blir observert jevnlig langs kysten av Hurumlandet, som nå er en del av Asker kommune, men slike funn rapporteres ikke lenger her. Skjærpiplerker blir også observert regelmessig på noen innlandslokaliteter, bl.a. i øvre deler av Buskerud, på vårtrekket i mars-april. Gjennomsnittlig ankomstdato: 29.3. ± 10 dager (26 år).

* hekkefunn (2)

Fåttallig hekkefugl i Buskerud. Arten er meget vanskelig å påvise hekkende, ikke minst med reirfunn. Hekkefunn blir derfor oftest påvist ved adult fugl som mater utflyynte unger. Arten observeres nå også regelmessig i øvre deler av Buskerud i sommerhalvåret. Verdt å nevne i den forbindelse er to funn i fjellbjørkeskogen 1000 moh. i 2020: 1 ad + 1 1K Lyserstølen, Nesbyen 9.7 (Rolf E. Andersen) og 2 ind. Solheimstulen, Nore og Uvdal 3.10 (Bjørn Lauritzen).


* alle funn (- 17/69)

2020: 1 ind. Gravset skistadion, Hemsedal 1.1 (Vegard Bang Fjeldheim, Stine Bang Fjeldheim). 3 ind. Kleivd, Hol 3.1 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 10 ind. Hennummarka, Tranby, Lier 6.1 (Jorunn Villand). 10 ind. Nystølane, Hemsedal 8.1 (Kristin Devor). 3-8 ind. Markehaugen, Hol 8.-31.1 (Wendy Slettemoen). 1 hunnfarget Juven, Hol 13.1-11.2 (Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass). 1 ind. Hovdetjenn vest, Haglebu, Sigdal 18.1 (Jan Olav Nybo). Minst 16 ind. Øvre Reinsjøfjell, Flå 18.-19.1 (Jan Olav Nybo). 2 adult hann Gomnes, Hole 19.1 (Terje Pettersen). 6 ind. Gravsetåsen, Hemsedal 19.1 (Bent Fjeldheim, Magnhild Finset Fjeldheim). 3 ind. Eilivsvollen, Helgesetvatnet, Flå 19.1 (Jan Olav Nybo). 1 hunn Hennummarka, Tranby, Lier 25.1 (Jorunn Villand). 1 hann Nedre Ulshagen, Ål, Ål 29.-31.1 (Elisabeth Økland). 1 hunn Hemsedal sentrum, Hemsedal 1.2 (Kristin Devor). 1 hann Haglebu, Sigdal 21.2 (Odd Gravir Klykken). 1 par Heggenveien/Sponevika, Modum 27.4 (Anne Sørensen). 2 ind. Tempelseter, Sigdal 5.12 (Stig Johan Kalvatn).



* alle funn (- 41/71)

2020: KONGSBERG: 2 hann sang/spill Hostvedt 30.5-12.6 (Morten Jagdum). LIER: 13 funn av 19 ind. i perioden 25.5. - 8.7. De fleste funn er gjort langs vestsida av Holsfjorden og i Lierdalen fra Sylling til Egge, i tillegg 1 syngende hann Linnestranda 29.5.-2.6. MODUM: 13 funn av 24 ind. i perioden 25.5. - 8.7. 11 av funnene er gjort langs Fv 284 fra Vikersund til grensa mot Lier. RINGERIKE: 10 funn av 14 ind. i perioden 20.5. - 14.6. 7 av funnene ble gjort i Hønefoss-området, 2 funn på Åsa og 1 funn på Muggerdal. ROLLAG: 1 ind. sang/spill Rollag 17.6 (Bjørn Lauritzen). ØVRE EIKER: maks. 5-6 ind. sang/spill Rudstøa-Hegstad-Hegstadmyra-Tårnet-Måsnesmyra, Fiskumvannet 20.-31.5 (Jens Magnussen, Jorunn Villand, Lars Dolmen, Steinar Stueflotten, Jostein Myre, Jon Ludvig Hals mfl.). 1-3 ind. sang/spill Råen, Fiskumvannet 23.5-2.7 (Jorunn Villand, Steinar Stueflotten, Lars Dolmen mfl.). 2 ind. Fiskumelva nedre, Fiskumvannet 26.5 (Lars Dolmen). 1-3 ind. sang/spill Rudstøa-Hegstad-Hegstadmyra-Tårnet, Fiskumvannet 3.6-11.7 (Melvin Åsum, Steinar Stueflotten, Lars Dolmen, Vegard Erik Hansen, Tommy Øvstebø mfl.). ÅL: 1 hann sang/spill, ikke hekking Breiehagen, Strandafjorden 12.6 (Torgrim Breiehagen).



* hekkefunn (0), vinterfunn (1)

Sjelden vintergjest. Vanlig, men ikke særlig tallrik hekkefugl i fjellområdene. Hekkefunn blir sjelden rapportert. Stort antall: 100 ind. i rapsåker på Onsaker, Hole 20-21.3 (Terje Pettersen).

tornirisk (*Linaria cannabina*):

* hekkefunn (1), vinterfunn (0)

2020: 1 par reirbygging Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 25.4 (Jorunn Villand).

Fåttallig hekkefugl i Buskerud, men konkrete hekkefunn blir sjelden rapportert. Sjelden vintergjest. Uvanlig store antall i 2020: minst 300 ind. Onsakervika, Hole 26.8 og 500 ind. i rapsåker Steinsvika, Hole 25.9 (Terje Pettersen).

brunsisik (*Acanthis cabaret*):

* funn ≥ 10 ind. (3), hekkefunn (1)

2020: 10 ind. Hvalsdammen, Drammen 1.2 (Berit Roll Elgsaas). 20 ind. Stryken, Hokksund, Øvre Eiker 2.3 (Steinar Stueflotten, Morten Winther Dahl). 25 ind. næringsøkende Skogliveien, Gulsbogen, Drammen 29.11 (Vidar Øverbye). 1 ind. reirbygging Dynodammen, Linnesstranda, Lier 12.4 (Jorunn Villand). 2 ind. mat til unger Linnesstranda, Lier 9.6 (Rolf E. Andersen).

Arten blir observert til alle årstider og antas å være minst like vanlig som gråsisik i lavlandet i hekketiden, men kan ofte være vanskelig å skille fra gråsisik i felt. Bare hekkefunn og flokker på minst 10 ind. er med i denne oversikten.

polarsisik (*Acanthis hornemanni*):

* alle funn (- 6/7) LRSK

2020: 1 hann Skinnillveien 77, Røyse, Hole 9.2 *(F) (Terje Pettersen). 1 ind. Knut Hamsuns vei 3, Kongsberg Sentrum, Kongsberg 11.2 *(F) (Morten Jagdum). 1 hann Reistad, Lier 8.3 (Hans Petter Rømme). 2 ind. Solheimstulen, Nore og Uvdal 10.4 (Bjørn Lauritzen). 1 ind. Eimå v.b, Hol 27.4 *(F) (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 hann Badeplassen Strandafjorden Øst, Ål 1.5 *(F) (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass).

Sjelden vintergjest i Buskerud (medio oktober - april). Færre funn i 2020 etter tre gode år med mange observasjoner av arten. Observeres som regel sammen med gråsisiker og kan være utfordrende å skille fra lyse individer av gråsisik. Derfor er det viktig at alle viktige kjennetegn blir grundig beskrevet/dokumentert som generell form og farge på fuglen, spesielt utseendet til flankestrekning og vingebånd, en tydelig og ustreket hvit overgump, hvit undergump med maksimalt en tynn mørk spolestrek og et lite spisst nebb. For at et funn skal kunne godkjennes som polarsisik, må summen av alle kjennetegn stemme da det kan være overlapp med gråsisik for enkelte kjennetegn.

grankorsnebb (*Loxia curvirostra*):

* hekkefunn (1)

2020: 1 ind. som samlet reirmaterial Oppkuven sør, Ringerike 12.1 (Kjetil Johannessen).

Vanlig hekkefugl i sterkt varierende antall, men hekkefunn blir sjelden rapportert. Arten hekker normalt tidlig og det ble gjort flere observasjoner av syngende hanner og par i passende hekkebiotop på seinvinteren og våren 2020, men sikre hekkefunn ble ikke påvist.

båndkorsnebb (*Loxia leucoptera*):

* alle funn (84 - 51/139) LRSK

2020: FLESBERG: 1 hann Huka, Søre Revlivann, Blefjell 18.4 (Eirik Kristoffersen). 1 hann og 1 hunn Søre Revlivann, Blefjell 21.5 (Eirik Kristoffersen). FLÅ: 1+1 hann Miljoseter 29.3 (Svein Dale). 1 ind. overflygende Fyrissjøen sør 29.3 (Svein Dale). 1 hann Sørbølsetran 11.5 (Inger Helene Hastum). 1 ind. ved føring Øvre Reinsjøfjell 24.12 (Jan Olav Nybo). GOL: 6 ind. Golsfjellet 26.2 (Kristin Devor). 1 ind. Narveset 27.3 (Kjell Einar Bie). 5 ind. Halleflæi, Golsfjellet Syd 1.6 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Solfrid Åsta Kvam). 1 hann Golsfjellet 13.12 (Per Stensland). HEMSEDAL: 2 ind. Blomeslettane 1.1 (Vegard Bang Fjeldheim, Stine Bang Fjeldheim). 1 hann Helsinglia 3 24.2 (Kristin Devor). 1 adult hann Eikredammen 5.4 (Bent Fjeldheim, Per Furuseth). HOL: 2 ind. Lia-teigen 19.1 og 6.2 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 6 ind. Knutskard 19.1 (Asgeir Askeland). 1 hann Knutskard 28.2 (Asgeir Askeland). HOLE: 1 ind. Røysetoppen, Røyse 26.1 (Terje Pettersen). 1 par Trehørningen 22.4 (Tobias Gjerde). LIER: 1 ind. Sørumsåsen 26.1 (Hans Petter Rømme). NESBYEN: 15 funn av 58 ind. i perioden 8.2. - 22.8., normalt bare 1-4 ind. sammen, maks. 10 ind. Buvatnet sør 15.2 (Terje Pettersen) og 20 ind. Fremre Trytehølet 2.5 (Terje Pettersen). Flere mulige hekkeindikasjoner bla. i Myking-området og hekking sannsynlig da 4 ungfugler ble observert på Sandfet Øf Nesbyen 31.5 (Svein M. Søggen) i samme område som hekking ble påvist i 2015. NORE OG UVDAL: 1 hann sang Sæterdalen, Breidset 19.5 (Gunnar Numme). RINGERIKE: 2 ind. Ultvedtjern NR, Åsa 13.2 (Marius von Glahn). 1 ind. Jaklefoss 13.2 (Marius von Glahn). 4 ind. Vikersætra 18.2 (Christian Dalen). 1 hann Vikersætra 29.5 (Marius von Glahn). 1 ind. Haugsbygda 6.8 (Terje Pettersen). SIGDAL: 1-6 ind. Hamregrenda 21.2-7.3 (Frode Steffensen). 1 ind. Haglebu 21.2 (Odd Gravir Klykken). 1 ind. Ruglandseter, Haglebu

[illegible]

A male Red-breasted Nuthatch is perched on a pine branch, surrounded by large, brown pinecones. The bird has a red head and back, a white belly, and black wings with white spots. The background is a clear blue sky.

42

dvergspurv (*Emberiza pusilla*):

* alle funn (3/3 - 1/1) LRSK

2020: 1 ind. næringssøkende Tunehago, Strandafjorden, Ål 20.11 *(F) (Hans Petter Kristoffersen).

Meget sjelden art i Buskerud, sist observert på Einseten, Hol 28.9.2017, før det kun to ringmerkingsfunn fra primo oktober 1987. Dette er første funn av arten i Ål kommune. De fleste observasjoner i Norge blir gjort om høsten fra september til medio november.



Dvergspurv Tunehago, Strandafjorden, Ål 20.11.20. Foto: Hans Petter Kristoffersen

sivspurv (*Emberiza schoeniclus*):

* vinterfunn (3/11 - 1/1)

2020: 1 ind. Linnestranda, Lier 3.2 (Steinar Stueflotten).

Sjelden vintergjest i Buskerud. Det forrige vinterfunnet ble også gjort på Linnestranda i januar 2016.

Ikke godkjente funn

Fjelljo *Stercorarius longicaudus* LRSK – Hol 23.07.20 (underkjent)

Svartehavsmåke *Ichthyæetus melanocephalus* LRSK – Drammen 07.06.20 (ufullstendig rapportering)

Nattergal *Luscinia luscinia* LRSK – Lier 30.04.20 (underkjent)

Trostesanger *Acrocephalus arundinaceus* NSKF – Øvre Eiker 18.06.20 (underkjent)

Trostesanger? *Acrocephalus arundinaceus* NSKF – Øvre Eiker 27.06.20 (ufullstendig rapportering)

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera* LRSK - Ringerike 07-08.03.20 (2 observasjoner, ufullstendig rapportering)

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera* LRSK - Sigdal 20-25.03.20 (3 observasjoner, ufullstendig rapportering)

Polarsisik *Acanthis hornemanni* LRSK - Drammen 01.02.20 (underkjent)

Polarsisik *Acanthis hornemanni* LRSK - Hol 17.04.20 (ufullstendig rapportering)

Det var flere funn enn normalt som ikke ble godkjent i 2020.

Rettelser til LRSK-rapport 2019

Følgende arter i LRSKs rapporteringsliste var feilaktig angitt med valideringsansvar NSKF: rødhøne, berghøne, gullfasan, silkehegre, roverterne og dverglerke. Det er LRSK som nå skal validere funn av disse artene. For fasanfuglene gjelder dette alle ikke-spontane/rømte individer.

Referanser

Breiehagen, T. & Furuseth, P. 2020. Hekkebestanden av horndykker (*Podiceps auritus*) i Buskerud 2019-20. Buskskvetten 36 (<http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html>), 12 s.

Falkenberg, F. 2020. Enorm invasjon av konglebit til Norge: Kjempefinker fra den nordlige taigaen på bærjakt i sør. Vår Fuglefauna 43 (1), s. 24-28.

Gunnarsen, T. 2020. Vandrefalk i Buskerud 2019-20. Utbredelse og hekkestatus. Buskskvetten 36 (<http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html>), 16 s.

Heggøy, O., Shimmings, P., Nordsteien, O. & Sæther, T. 2020. Magert med lappspurv i 2020. Vår Fuglefauna 43 (4), s. 210-216.

Stueflotten, S. 2019. Sjeldne fugler i Buskerud 2018. Buskskvetten 35 (<http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html>), 36 s.

Stueflotten, S. 2020. Sjeldne fugler i Buskerud 2019. Buskskvetten 36 (<http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html>), 38 s.

LRSKs innrapporteringsliste

Koder:

Krever beskrivelse:

X	Observasjoner skal rapporteres til LRSK med utførlig beskrivelse/dokumentasjon for godkjenning. NSKF bak koden indikerer at NSKF skal godkjenne funnet.
---	---

I tillegg kommer alle arter som ikke tidligere er registrert i Buskerud og/eller Norge. Dette gjelder også vinterfunn av flere trekkfuglarter. Bare fotodokumenterte hybrider blir innlemmet i årsrapporten med unntak for gåsehybriden kanadagås x grågås. Rapporteringslista er samordnet med rapporteringslista til NFKF.

Beskrivelse ikke nødvendig:

x	Observasjoner skal rapporteres til LRSK
H	Hekkefunn skal rapporteres til LRSK.
S	Sommerfunn skal rapporteres til LRSK.
V	Vinterfunn skal rapporteres til LRSK.
I	Innlandsfunn skal rapporteres til LRSK.
N	Funn fra nedre deler av Buskerud skal godkjennes av LRSK.
Ø	Funn fra øvre deler av Buskerud skal godkjennes av LRSK.
≥ n	Flokker på ≥ n individer skal rapporteres til LRSK

Versjon 2021, gyldig fra 01.01.2021

x	Ringgås
X	<i>Ringgås underarter</i>
VH	Hvitkinngås
x	Stripegås
x	Snøgås
X	Taigasædgås
V, ≥1000	Kortnebbgås
X	Tundrasædgås
x	Tundragås
X	<i>Tundragås underarter</i>
X	Svartsvane
X	Dvergsvane
SH	Sangsvane
X NSKF	Niland
VH	Gravand
X NSKF	Rustand
x	Knoppand/Moskusand
X	Brudeand
x	Mandarinand
x	Knekkand
X NSKF	Blåvingeand
x	Skjeand
x	Snadderand
H	Brunnakke
X NSKF	Amerikablesand
X NSKF	Rødfotand
VH	Stjertand
X	Amerikakrikkand
X NSKF	Rødhodeand
x	Taffeland
VH	Bergand
X	Stellerand
I	Ærfugl
H, ≥ 20	Sjøre
H, ≥ 20	Svartand
x	Havelle
x	Lappfiskand
X NSKF	Stivhaleand
X	Rapphøne
X	Gullfasan
x	Vaktel
X	Rødhøne
X	Berghøne
x	Nattravn
X NSKF	Gråseiler
X NSKF	Steppehøne
VH/XØ	Skogdue
X	Turteldue
H, ≥ 5	Tyrkerdue
x	Vannrikse
x	Åkerrikse
x	Myrrikse
VH	Sivhøne
VH	Trane
x	Dvergdykker
X	Gråstruedykker
VH	Toppsykker
x	Horndykker
X NSKF	Svarthalsdykker
V	Tjeld
X	Avosett
VH	Vipe

x	Tundralo
H	Dverglo
x	Boltit
H	Småspove
H	Storspove
X	Lappspove
X	Svarthalespove
x	Steinvender
x	Polarsnipe
VH	Brushane
X	Fjellmyrløper
X	Tundrasnipe
x	Temmincksnipe
x	Sandløper
V	Myrsnipe
x	Fjæreplytt
x	Dvergsnipe
X	Alaskasnipe
V	Rugde
X	Kvartbekkasin
x	Dobbeltbekkasin
V	Enkeltbekkasin
x	Svømmesnipe
X	Polarsvømmesnipe
x	Sotsnipe
x	Krykkje
X	Sabinemåke
H	Hetemåke
X	Dvergmåke
X	Svartehavsmåke
H	Fiskemåke
X	Polarmåke
X	Grønlandsmåke
V	Sildemåke
X	Rovterne
X	Splitterne
X NSKF	Dvergterne
XØ/H	Makrellterne
XN/H	Rødnebbterne
X	Svarterne
X	Storjo
X	Polarjo
X	Tyvjo
X	Fjelljo
I	Alkekonge
X	Polarlomvi
I	Lomvi
I	Alke
x	Teist
x	Lunde
VH	Smålom
VH	Storlom
X	Islom
X	Gulnebbblom
X NSKF	Svartbrynalbatross
X NSKF	Gråhodealbatross
X	Stormsval
x	Havhest
X	Grålire
X	Havlire
X NSKF	Stork
x	Havsule

H	Storskarv
X	Toppskarv
X NSKF	Bronseibis
X NSKF	Skjestork
X	Rørdrum
H	Gråhegre
X	Egretthege
X	Silkehegre
H	Fiskeørn
X NSKF	Munkegribb
H	Vepsevåk
X NSKF	Steppeørn
N	Kongeørn
H	Hønsenhauk
x	Sivhauk
x	Myrhauk
X	Steppehauk
X NSKF	Engenhauk
X	Glente
X	Svartglente
X NSKF	Båndhavørn
x	Havørn
V	Fjellvåk
V	Musvåk
x	Haukugle
VH	Hornugle
VH	Jordugle
X	Snøugle
X	Hubro
X	Slagugle
X	Lappugle
x	Hærfugl
X NSKF	Blåråke
x	Isfugl
X	Bieter
H	Dvergspett
X	Hvitryggspett
H	Gråspett
V	Tårnfalk
X	Aftenfalk
V	Dvergfalk
x	Lerkefalk
x	Jaktfalk
V	Vandrefalk
H	Tornskate
X NSKF	Rødhalevarsler
x	Varsler
X	Pirol
N	Lavskrike
H	Nøttekråke
X	<i>Sibirnøttekråke</i>
x	Kornkråke
X	Svartkråke
X	Lappmeis
XØ	Løvmeis
X	Skjeggmeis
X	Trelerke
V	Sanglerke
X NSKF	Topplerke
x	Fjellerke
X	Dverglerke
X	Gulbrynsanger

X NSKF	Fuglekongesanger
V	Gransanger
X	<i>Sibirgransanger</i>
X NSKF	Østsanger
X NSKF	Trostesanger
x	Sivsanger
X	Busksanger
x	Myrsanger
X	Elvesanger
x	Gresshoppesanger
V	Munk
X	Hauksanger
X	Rødtoppfuglekonge
X	Rosenstær
V	Måltrost
V	Duetrost
V	Ringtrost
X NSKF	Svartstrupetrost
H	Nattergal
X NSKF	Sørmattergal
X	Dvergfluesnapper
X NSKF	Halsbåndfluesnapper
X	Svartrodstjert
X	Svartstrupe
X NSKF	Asiasvartstrupe*
X NSKF	Ørkensteinskvett
X NSKF	Svartstrupesteinskvett
V	Jernspurv
X	<i>Sørliq gulerle</i>
X	<i>Engelsk gulerle</i>
X	Sitronerle
V	Vintererle
V	Linerle
X	<i>Svartryggerle</i>
X	Tartarpiplerke
V	Heipiplerke
X	Lappiplerke
x	Skjærpiplerke
H	Kjernebiter
x	Konglebit
x	Rosenfink
VH	Bergirisk
VH	Tomirisk
H, ≥ 10	Brunsisik
X	Polarsisik
H	Furukorsnebb
H	Grankorsnebb
x	Båndkorsnebb
H	Stillits
X NSKF	Gulirisk
x	Lappspurv
X	Hortulan
X	Dvergspurv
X	Vierspurv
X NSKF	Svarthodespurv
V	Sivspurv
X NSKF	Lazulispurv
X	Hybrider (fotodok.)
x	Kanadagås x grågås